

<div data-bbox="148 168 448 259" data-label="Page-Header"> <div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div> </div>	과목명	<div>한의학문제풀이정답</div> <div>30회</div>		<div>감독관</div> <div>확 인</div>
---	-----	-------------------------------------	--	-------------------------------

시행 : 12월 15(일)		수험 번호		성 명		<div>인</div>
문항/ 시간	문항:					

01. ④
02. ① 郭使君이 소아질환에 사용
03. ②
04. ②
05. ④
06. ④
07. ①
08. ②
09. ④
10. ⑤
11. ②
12. ④ 勞宮은 손바닥에 위치
- 두면(경향)부: 瘕門
- 복부: 中脘
- 상지부: 勞宮, 合谷
- 하지부: 三陰交, 湧泉, 太谿, 環跳, 足三里
13. ⑤
14. ⑤
15. ⑤
16. ③
17. ② 程國彭(=程鐘齡)
18. ① 생리학 p532~534
19. ② 죽여는 강자법으로 화위지구, 한성완화 /
- 시호는 초자법으로 활혈산어 소간지통의 효능 증대
- / 승마는 주자하여 약을 상행 / 마두령은 밀자하여
- 교취, 교미, 부작용 제거
20. ③ 가-魂, 나-神, 다-志, 라-神
21. ③ 五七 陽明脈衰 面始焦 髮始墮

22. ②
- 青色小理者 肝小, 粗理者 肝大, 廣胸反骹者 肝高,
- 合脇兔骹者 肝下, 胸脇好者 肝堅, 脇骨弱者 肝脆,
- 膺腹好相得者 肝端正, 脇骨偏舉者, 肝偏傾也.
- 赤色小理者 心小, 粗理者 心大, 無髑肝者 心高,
- 髑肝小短舉者 心下, 髑肝長者 心堅,
- 髑肝弱小以薄者 心脆 髑肝直下不舉者 心端正,
- 髑肝倚一方者 心偏傾也.
- 黃色小理者 脾小, 粗理者 脾大, 揭脣者 脾高,
- 脣下縱者 脾下. 脣堅者 脾堅, 脣大而不堅者 脾脆,
- 脣上下好者, 脾端正, 脣偏舉者, 脾偏傾也.
- 白色小理者 肺小, 粗理者 肺大, 巨肩反膺陷喉者
- 肺高, 合腋張脇者 肺下, 好肩背厚者 肺堅,
- 肩背薄者 肺脆, 背膺厚者 肺端正, 膺偏欹者
- 肺偏傾也.
- 黑色小理者 腎小, 粗理者 腎大. 耳高者 腎高,
- 耳後陷者 腎下. 耳堅者 腎堅, 耳薄不堅者 腎脆.
- 耳好前居牙車者 腎端正, 耳偏高者, 腎偏傾也.
23. ①
24. ①
25. ④
26. ①
27. ⑤ 苦味, 清熱燥濕藥
28. ⑤ 利水消腫은 黃芪만 해당
- 人蔘味甘補元氣 止渴生津調營衛 / 甘微苦 / 脾肺心
- 黃芪甘溫收汗表 托瘡生肌虛莫少 / 甘溫 / 肺脾
29. ③
30. ④
31. ⑤
32. ⑤

33. ③

CF) 排便不爽이 주소증일 경우

- 1) 腹痛泄瀉가 있으나 排便이爽快하지 않고, 腹脹이 있으면서 放氣를 많이 하는 것: 肝氣犯脾
- 2) 泄瀉를 하나 排便時에 爽快的 감이 없으며 排便中에 소화 되지 않은 음식물이 있으면서 酸臭한 냄새로 냄새 맡기가 어려울 경우: 傷食泄瀉
- 3) 泄瀉를 누런 미음같이 하되 爽快하지 않으며 口粘而渴한 症狀을 同伴할 경우: 濕熱

34. ⑤ 十怪脉者, 一曰釜沸, 二曰魚翔, 三曰彈石, 四曰解索, 五曰屋漏, 六曰蝦遊, 七曰雀啄, 八曰偃刀, 九曰轉豆, 十曰麻促.

- 釜沸: 脉在皮肉, 有出無入, 如湯涌沸, 息數俱無. 乃三陽數極, 無陰之候. 朝見夕死, 夕見朝死.
- 魚翔: 脉在皮膚. 頭定而尾搖, 浮浮泛泛. 三陰數極, 又曰亡陽. 當以死斷. / 魚翔脉, 似有似無.
- 彈石: 脉在筋肉間. 辟辟湊指 急促而堅. 乃腎經眞藏脉見, 遇戊己日則不治. / 彈石硬來, 尋即散.
- 解索: 脉如解亂繩之狀, 散散無序. 腎與命門之氣皆亡, 戊己日篤, 辰巳日不治.
- 屋漏: 脉在筋肉間. 如殘雷之下, 良久一滴濺起無力. 如水滴濺地貌, 胃氣榮衛俱絕, 七八日死.
- 蝦遊: 脉在皮膚. 如蝦遊水面, 杳然不見, 須臾又來, 隱隱然不動, 依前又去. 醒者七日死, 困者三日死.
- 雀啄: 脉在筋肉間. 連連湊指 忽然頓無, 如雀啄食之狀, 盖來三而去一也. 脾元穀氣已絕於內, 醒者十二日死, 困者六七日亡.
- 偃刀: 脉如手循刀刃. 無進無退其數無准. 由心元血枯, 衛氣獨居, 無所歸宿, 見之四日難療.
- 轉豆: 脉形如豆, 周旋展轉, 并無息數. 藏府空虛, 正氣飄散, 象曰行尸, 其死可立待也.
- 麻促: 脉如麻子之紛亂, 細微至甚. 盖衛枯榮血獨澁. 輕者三日死, 重者一日殂矣.

cf) 眞肝脉至, 中外急如循刀刃, 責責然如按琴瑟絃. 眞心脉至, 堅而搏, 如循薏苡子累累然. 眞肺脉至, 大而虛, 如以毛羽中人膚. 眞腎脉至, 搏而絕, 如指彈石辟辟然. 眞脾脉至, 弱而乍數乍疏. 諸眞藏脉見, 皆死不治也

35. ③

36. ④

37. ⑤

- 瘀血: 보통 陰虛를 주 원인으로 보지 않음
- 血瘀: 血熱 등에 의한 津液耗傷을 원인으로 볼 수 있음

38. ②

39. ③

40. ③

涼開: 熱閉 清熱開竅 / 安宮牛黃丸 紫雪丹 至寶丹
溫開: 寒閉 溫通開竅 / 蘇合香元