

시행 : 12월 29(일)		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간	문 항:				

01. ①
02. ⑤
03. ②
04. ②
05. ③
06. ③
07. ②
08. ④
09. ④
10. ④ 국내 원본 소실, 일본 궁내성 도서관에 원본
11. ①
12. ① 尤怡 <金匱要略心典>, 徐彬 <金匱要略論注>, 程林 <金匱要略直解>
 ※ 상한론 판본: 1) 趙本: 治平本을 명나라 萬曆 연간에 趙開美가 復刻한 것. 2) 汪本: 成無己 註解傷寒論을 명나라 嘉靖 연간에 汪濟川이 복각한 것.
 3) 金匱玉函經: 8권 29편이고, 傷寒論 내용과 같지만 조문 배열이 똑같지는 않고 조문이 앞, 약방이 뒤에 있음.
13. ④ <靈樞 衛氣失常> 黃帝問于伯高曰 人之肥瘦大小寒溫 有老壯少小 別之奈何
 伯高對曰 人年五十已上爲老 二十已上爲壯 十八已上爲少 六歲已上爲小
14. ③
15. ③ [내경 14, 금궤요략 262, 천금요방 5300, 태평혜민화제국방 788, 국방발휘 297]
16. ① 唐代 -> 宋代
17. ② 上部天 兩額之動脈 / 上部地 兩頰之動脈 / 上部人 耳前之動脈 / 中部天 手太陰也 太淵穴 / 中部地 手陽明也 合谷穴 / 中部人 手少陰也 神門穴 / 下部天 足厥陰也 太衝穴 / 下部地 足少陰也 太谿穴 / 下部人 足太陰也 衝陽穴

18. ① 乾薑
19. ④
20. ③
21. ① 去心: 根類 약물의 木質部나 種子의 胚芽 제거 (麥門冬, 天門冬, 蓮子, 巴戟天, 地骨皮, 牡丹皮, 烏藥, 五加皮, 白蘇皮, 遠志) cf) 최근 임상에서 麥門冬은 특별히 제거하지 않으며 蓮子是 蓮子肉과 蓮子心을 구분
22. ③ 十二刺法

명칭	자침방법	원문
偶刺	하나는 가슴, 하나는 등에 자침	一刺前 一刺後 以治心痺 刺此者 傍鍼之也
輸刺	곧게 찌르고 바로 빼기.	直入直出 以治氣盛而熱者也 (출혈 X)
傍鍼刺	경맥에 하나, 락맥에 하나씩 자침.	直刺傍刺各一 以治留痺 久居者也
齊刺	직자 하나, 옆에 좌우 두 개.	直入一 傍入二 以治寒氣 小深者
贊刺	직입직출, 出血 시킴.	直入直出 數發鍼而淺之 出血
揚刺	가운데 하나 꽂고, 주위에 4개 자침.	正內一傍內四 以治寒氣之博大者
短刺	骨痺치료, 침을 돌리면서 深刺.	刺骨痺 稍搖而深之 致鍼骨所 摩骨也
恢刺	근맥 구급한 곳 옆에 직자.	直刺傍之 以治筋痺也
陰刺	좌우 양쪽에 자침, 寒厥 치료.	陰刺者 左右率刺之 以治寒厥
浮刺	비스듬히 자침, 기욕이 당기고 찬 것 치료.	傍入而浮之 以治肌急而寒者也
報刺	통처고정 x, 통처보이면 빼서 다시 꽂음.	刺痛無常處也
直鍼刺	피부 끌어올려 자침. 寒氣가 淺表에 있는 것 치료.	引皮乃刺之 以治寒氣之淺者也

23. ② 白茯苓, 白芍藥, 附子, 白朮, 生薑
24. ③
25. ⑤
26. ③
27. ③
28. ③

29. ①

30. ⑤

31. ①

32. ③

33. ④

34. ⑤ 麥門冬, 半夏, 粳米, 大棗, 人蔘, 甘草

35. ②

36. ③

37. ②

黃帝께서 말씀하시기를 風厥과 漚汗의 병이 자주 발생하는 사람을 어떻게 알 수 있습니까? 少俞가 답하여 말하기를 肉이 단단하지 않고 腠理가 성글면 風病을 잘 앓게 됩니다. 黃帝께서 말씀하시기를 어떻게 肉이 단단하지 않음을 알 수 있습니까? 少俞가 답하여 말하기를 오금의 肉이 단단하지 않으며 살결이 나누어지지 않았으며 나누어졌더라도 살결이 거칩니다. 살결이 거칠면서 皮膚가 치밀하지 않은 것은 腠理가 성긴 것이니 이는 그 渾然함을 말합니다.

38. ③ 閃罐(섬관) : 罐을 흡착시켰다가 바로 땀, 여러번 반복하여 피부가 홍조를 띠면 그침

留罐(유관) : 罐을 부착시킨 후, 일정시간(5~15분) 방치함

走罐(주관) : 윤활제를 罐口나 附缸 운용 부위에 바른 후, 罐을 부착시킨 상태에서 상하 좌우로 여러 차례 이동

藥罐(약관) : 罐내에 일정 약물을 넣은 상태에서 시술 부위에 부착

鍼罐(침관) : 일정 부위에 자침하여 留鍼한 상태에서 罐을 부착

39. ①

40. ①