

한의학문제풀이(2회)

01. ①

02. 〇

03. 露 孫脈

04. 中焦

05. 氣腫 水腫

06. 陽絡 陰絡 脾之大絡.

07. 癭 瘤

08. ③

胃陰不足 : 胃는 喜潤惡燥하므로 胃液이 마르면 嚴重한 受納腐熟機能減退가 됨.

① 원인 ㉠ 熱病後期에 邪熱이 오래 머물러 陰을 손상함

㉡ 久病이 회복되지 않아 全身 精血陰津이 소모되어 발생

② 병리표현 - 胃陰枯涸 -> 不思飲食, 舌質光紅無苔, “乾嘔呃逆” 심하면 鏡面舌

- 胃陰虛로 和降失調하여 胃氣上逆 => 脘腹脹滿하는 虛痞, 泛惡, 乾嘔

- 胃氣衰敗 => 口糜

*胃氣는 正常的으로는 ‘上→下’한다.- 足陽明胃經

胃氣가 上逆한다는 것은 病理的 現狀이다.

09. 皮毛 絡脈 經 腸胃

10. 足厥陰- 足太陰 -足少陰

11. ①

膽汁分泌排泄障礙

① 病機 : 원인 ㉠ 情志所傷 ㉡ 肝鬱氣滯(肝失疏泄)

㉢ 中焦濕熱熏蒸하여 肝膽鬱熱化火하여 膽汁排泄장애

② 병리표현 :

- 膽汁障礙의 영향 : 肝鬱氣滯를 加重, 脾胃運化機能 阻遏,

胃에 膽汁逆流하여 胃氣上逆 또는 血脈에 外溢하여 黃疸을 발생시킴

- 膽病의 主要症狀 : 寒熱往來, 口苦, 脇痛, 黃疸

12. ③

13. ①

14. ⑤

滑脈 : 脈形往來流利圓滑, 無病脈(妊娠), 主病 -痰飲,食積, 實熱, 妊娠期

15. ①

16. ④

17. ②

飲在腸間(痰飲)==>腸鳴漉漉有聲

飲在胸脇(懸飲)==>胸脇脹滿, 咳唾引痛

飲在胸隔(支飲)==>胸悶, 咳喘, 不能平臥

飲溢肌膚(溢飲)==>肌膚水腫, 無汗, 身體疼痛

18. ③

<止血藥> : 體內外的 出血을 制止하는 약물

1) 收斂止血藥 : 虛損不足이나 外傷出血의 失血證에 좋은 효과 =>炒炭하여 사용하면 효과 ↑

▶ 仙鶴草, 白及, 棕櫚皮, 藕節

2) 涼血止血藥 : 寒涼 - 血熱妄行으로 인한 出血證에 사용

▶ 大蓟, 小蓟, 地榆, 槐花, 側柏葉, 苧麻根, 白茅根, 羊蹄根

3) 化瘀止血藥 : 化瘀作用을 가지고 있는 止血藥

▶ 三七根, 蒲黃, 茜草根, 花蕊石

4) 溫經止血藥 : 溫性 - 虛寒性的 出血證에 사용

▶ 艾葉, 伏龍肝

19. ①

條劑 : 細棒으로 瘡口에 插入

線劑 : 痔漏, 贅肉 제거시 瘻管또는 贅肉을 結紮하여 두면 萎縮되어 자연히 탈락함

浸洗劑 : “疏其汗孔 宣導外部”(聖濟總錄), 礬石湯

導藥 : 蜜煎導法

坐藥 : 陰道 내에 插入하여 부인의 白帶, 陰痒 등 질환 치료

20. ⑤

21. ③

22. ④

勝復: 五運六氣의 一年間의 相勝相制/先勝後復의 상호관계를 말함. 비정상적 변화 후에 스스로 평형을 회복하는 機轉임.

23. 12 3 3 11

24. 11 9 6 4

25. 9 2 6 3

26. 12 7 5 1

27. 7 10 11 7

28. 10 8 3 5

29. 11 3 8 7

30. ⑪

31. 6 5 1 1 3 8 4 4 7 2 2

32. 氣衝 - 幽門

33. 長強 - 鬲交

34. 會陰 - 承漿

35. 督脈

36. 任脈

37. 衝脈

38. 督·任·衝脈

39. ① 氣는 無形, 無象이기에 감각기능이나 사물과 현상의 변화에 근거하여 그 실재를 인식할 수 있다

40. ③ 小腸經 - 少澤 - 聽宮

41. ②

本經	八穴	通穴脈	主治
足太陰(脾)	公孫	衝脈	心, 胸, 胃 (痛症을 爲主)
手厥陰(心包)	內關	陰維	
手太陽(小腸)	後谿	督脈	目內眦, 頸項(項強), 耳, 肩膊, 小腸, 膀胱
足太陽(膀胱)	申脈	陽蹻	
足少陽(膽)	足臨泣	帶脈	目外眦, 耳後, 頰, 頸(膽經筋 異常時), 肩
手少陽(三焦)	外關	陽維	
手太陰(肺)	列缺	任脈	肺系, 咽喉, 胸膈
足少陰(腎)	照海	陰蹻	