

01. 血의 정상적 운행의 필수조건이 아닌 것은?

- ① 心氣充布 ② 血液充盈
③ 脈道通暢 ④ 三焦通利
⑤ 肺肝脾기능의 정상

02. 氣와 血의 관계의 주요한 표현은?

- ① 先天後天 ② 생성과 분포
③ 생화와 운동 ④ 기능과 구조
⑤ 모두 아님

03. 三焦에 대한 설명 중 올바른 조합은?

가. 주요생리기능은 主持諸氣하는 것과 水穀運行의 道路가 되는 것이다

나. 張介賓은 三焦를 孤府라 하여 오직 三焦가 유독히 커서 이와 필적할 만한 臟腑는 없다고 했다

다. 中藏經에서는 三焦를 人之三元之氣라 했고 難經에서는 原氣之別使라 했다

라. 부위별로 보면 肝은 王叔和에 의하면 中焦에 속한 것으로 확립되었고 후세 溫病學派가 三焦辨證을 창시하면서 肝을 下焦에 배속하였다

마. 難經에서 三焦가 有名而無形이라 하는 견해가 시작되었지만 內經에서는 有名有形한 것으로 논술하고 있다

- ① 가나다 ② 가다라마
③ 가나다라 ④ 가나다라마
⑤ 가나다마

04. 다음 醫家에 대한 설명 중 맞는 조합은?

가. 葉桂는 字는 天士이고 溫病을 衛氣營血로 나누어 辨證論治하였다.

나. 吳璿의 字는 鞠通이며 溫病條辨을 지었다

다. 喻嘉言은 醫門法律과 尚論篇을 지었다

라. 現存하는 우리 나라 최고의 의서는 鄉藥救急方이다

마. 本草綱目拾遺는 趙學敏, 汪昂은 本經疏證을 지었다

- ① 가 나 다 라 ② 나 다 라 마
③ 가 나 다 라 마 ④ 가 다 라 마
⑤ 가 나 다

05. 苦寒瀉火藥으로 열병을 치료했는데 도리어 熱象이 加重되는 경우에 사용할 수 있는 치법은?

- ① 滋養陰液 ② 苦寒藥物을 加重시킨다
③ 清利濕熱 ④ 寒熱竝用

06. 五輸穴의 主治病에서 脾之疾患이나 體重節通의 치료와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 井穴
② 榮穴
③ 俞穴
④ 經穴
⑤ 合穴

07. 眼瞼開闔과 下肢運動을 주관하는 경맥은?

- ① 肝經
② 督脈
③ 任脈
④ 帶脈
⑤ 陰陽蹻脈

08. 다음 十二經脈과 奇經八脈의 起始, 終止穴의 조립 중 틀린 것은?

- ① 肺經：中府 - 少商
② 小腸經：少澤 - 聽宮
③ 心包經：極泉 - 少衝
④ 督脈：長強 - 翳交
⑤ 衝脈：氣衝 - 幽門

09. 다음 八綱辨證의 내용 중 病位과 관계 깊은 것은?

- ① 陰陽 ② 表裏
③ 寒熱 ④ 虛實

10. 少陰病에 대해 맞는 것으로 묶은 것은?

가. 提綱은 脈微細 但欲寐

나. 心腎虛衰와 氣血不足

다. 少陰寒化證은 陽이衰弱하고 陰寒이 內部에서 왕성하니 치법으로 回陽救逆法을 쓰고 처방은 四逆湯.

라. 少陰寒化證에는 陰盛格陽證-通脈四逆湯, 戴陽證-白通湯, 陽虛身痛證-附子湯, 陽虛水犯證-眞武湯 등으로 나눌 수 있다.

마. 少陰熱化證에는 腎陰不足 心陽亢盛한 것으로 育陰清熱하는 黃連阿膠湯을 쓴다.

① 가, 나, 다

② 가, 다, 마

③ 나, 라, 마

④ 가, 나, 다, 라

⑤ 가, 나, 다, 라, 마

11. 發熱惡寒 汗出 小便不利 煩渴 水入則吐 脈浮 或 浮數과 관계깊은 六經病은?

① 太陽中風證

② 太陽傷寒證

③ 蓄血證

④ 蓄水證

⑤ 少陽病

12. 太陰人에 관한 것이다 잘못 말하고 있는것은?

① 貪而不仁 下齊湛湛 好內而惡出 不務於時

② 太陰之藥 宜通外而不宜固中

③ 肝大肺小 多陰正陽

④ 땀이 많이 나는 체질이므로 寒邪에 感하면 강한 發表藥은 禁한다. 肝系의 優勢를 抑制하고 肺系의 劣勢를 보강치료

⑤ 콩 수수 들깨 울무 감 밤 도라지 연근 잉어 두부 미역 등이 잘 맞는 음식이다.

13. 胃의 病理를 잘못 말한 것은?

① 胃氣虛-納呆食少 飲食無味 脘部脹痛 噯氣呃逆

② 胃寒-納呆食少 脘中冷痛

③ 胃熱-嘈雜 消穀善飢 不思飲食 大便秘結

④ 胃陰虛-舌質光紅無苔 乾嘔噯逆 鏡面舌 口糜

⑤ 肝氣犯胃-和降失職 噯氣炭酸 嘔吐 胃脘痛

14. 心肝血虛증상으로만 짝지은 것은?

① 心悸怔忡 健忘 肢體麻木 目昏

③ 健忘 多夢 小腹痛 屈伸不利

⑤ 肢體麻木不仁 眩暈 目花 虛風內動

② 心悸怔忡 失眠 多夢 五心煩熱

④ 面色不華 夢寐不寧 血凝滯不通

15. 肝陰不足의 轉變過程이 아닌것은?

① 肝血不足

③ 肝風內動

⑤ 肝火上炎

② 腎陰不足

④ 肝陽上亢

16. 肝氣鬱結의 轉變過程이 아닌것은?

① 肝火上炎

③ 經不調

⑤ 肝陽上亢

② 梅核氣

④ 血瘀

17. 다음 병증에서 實證으로만 조합된 것은?

가. 肝鬱

나. 肝火上炎

다. 肝膽濕熱

라. 肝陽上亢

① 가, 나, 다

③ 나, 라

⑤ 가, 나, 다, 라

② 가, 다

④ 라

18. 肝氣鬱結에서 나타날 수 있는 증후가 아닌 것은?

① 肢體麻木등의 筋脈不利

③ 胃脘脹滿등의 肝胃不和

⑤ 少腹脹痛 月經不調등의 肝氣下逆

② 胸脇滿悶등의 肝氣上逆

④ 躁急易怒 抑鬱등의 情志變化

19. 急躁易怒 兩脇脹痛 腹脹 腹鳴 泄瀉 등의 증상과 관계 깊은 것은?

① 肝火上炎

③ 肝氣犯胃

⑤ 肝陽上亢

② 肝氣鬱結

④ 肝氣犯脾

31. 肺氣虛로 인한 증상으로 맞게 조립된 것은?

가.全身衰弱	나.身體消瘦	다.咽乾口燥
라.聲音低微	마.神疲勞	

- | | |
|-----------|-----------|
| ① 가, 나, 다 | ② 나, 라, 마 |
| ③ 가, 라, 마 | ④ 나, 다, 라 |
| ⑤ 가, 나, 라 | |

32. 肺陰虛의 증상으로 옳게 조립된 것은?

가.身體消瘦	나.乾咳痰少
다.咽乾口燥	라.聲嘶

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

33. 九氣治法 중 틀린것은?

- | | |
|----------|--------|
| ① 結者散之 | ② 驚者平之 |
| ③ 喜者以恐勝之 | ④ 勞者補之 |
| ⑤ 下者舉之 | |

34. 諸家の 命門학설 中 옳은 조합은?

가.難經-兩腎總命門	나.虞搏-左腎右命門
다.李梴-心包命門	라.孫一奎-腎間動氣

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

35. 尿頻數而清 腰膝痠軟 畏寒 肢冷등의 증상에 알맞은 치법은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 建脾益氣 | ② 理氣活血 |
| ③ 溫腎助陽 | ④ 滋陰補正 |
| ⑤ 補氣補血 | |

36. 腎陰虛의 증상이 아닌 것은?

- | | |
|--------|---------|
| ① 消瘦 | ② 腰膝痠軟 |
| ③ 面色蒼白 | ④ 脈虛細而數 |
| ⑤ 耳鳴 | |

37. 脾腎陽虛 증상은?

가. 心悸喘促	나. 水腫脹滿
다. 遺精早泄	라. 腹脹便溏

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

38. 腰膝痠軟 盜汗 五心煩熱 烘熱 強中 性機能亢進 夢遺早泄 과 관계 깊은 병리는?

- | | |
|----------|--------|
| ① 命門相火過亢 | ② 腎陽虛 |
| ③ 腎陰虛 | ④ 腎氣不固 |
| ⑤ 腎精虧虛 | |

39. 腎이 苦燥 할 때 적절한 藥物은?

- | | |
|---------|---------|
| ① 蒼朮 蘇葉 | ② 附子 肉桂 |
| ③ 知母 黃柏 | ④ 茯苓 澤瀉 |
| ⑤ 熟地 當歸 | |

40. 心腎不交에 속하지 않는 것은?

- | | |
|--------------|-----------|
| ① 性機能亢進 遺精早泄 | ② 虛煩不眠 多夢 |
| ③ 心悸 健忘 | ④ 心煩 驚悸 |
| ⑤ 動則心悸 氣短 | |