

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하라 (01~07)

(a)使聖人預知微，能(b)使良醫得(c)蚤(d)從事 則疾可(e)已 身可活也 人之所(f)病 病疾多 而醫之所病
(g)病道少 故 病有六不治 驕恣不論於理 一不治也 (h)輕身(i)重財 二不治也 衣食不能(j)適 三不治也 陰陽并
藏氣不定 四不治也 形(k)羸不能(l)服藥 五不治也 (m)信()不信() 六不治也 有此一者 則(n)重難治也。(o)()
名聞天下 過(p)邯鄲 聞貴婦人 即為(q)()過雒陽 聞周人愛老人 即為耳目(r)()來入咸陽 聞秦人愛小兒
即為小兒醫 (s)隨俗為變。

01. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① (a)使 - 시키다, 사역동사
② (b)使 - 시키다, 사역동사
③ (c)蚤 - 일찍
④ (d)從事 - 의미상 의료에 종사하다
⑤ (e)已 - 치료되다.

02. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① (f)病 - 근심하다 ② (g)病 - 질병
③ (h)輕 - 품사는 동사이다 ④ (i)重 - 중히 여긴다
⑤ (j)適 - 품사는 동사이다

03. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① (k)羸 - 독음은 ‘리’이다 ② (l)服 - 먹다
③ (n)重 - 거듭, 이중으로 ④ (p)邨 - 독음은 감이다
⑤ (s)隨 - 따르다, 쫓다

04. (m)信()不信()에 들어갈 글자를 차례대로 쓰라

05. (o)에 들어갈 의가의 이름을 한자로 쓰라

06. (q)에 들어갈 당시의 韓醫學 分科를 쓰라

07. (r)에 해당하는 용어를 쓰라

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.(08~09)

伏羲氏 以木德王 風姓 蛇首人身 生有聖德 象日月之明 故曰太昊. 母居於華胥之渚 履巨人跡 因始有妊
生帝都于陳. 其理天下也 仰觀象于(가) 俯觀法于(나) 中觀萬物于(다) 鳥獸之文 與地之宜 近取諸身
遠取諸物 始畫(라)以通神明之德 以類萬物之情. <太昊伏羲氏>

08. (가), (나), (다)에 들어갈 한자를 차례로 쓰시오.

09. (라)에 알맞은 한자를 고르시오.

- ① 河圖
- ③ 八卦
- ⑤ 六書

- ② 洛書
- ④ 周易

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.(10~13)

且人之疾病, 皆生於不善調攝, (가)爲先(나)次之, 諸方浩繁, 務擇其要, 窮村僻巷, 無醫藥而夭折者多,
我國鄉藥多產 而人不能知爾, 宜分類並書鄉名, 使民易知.
浚退與儒醫鄭碯, 太醫(다)(라)(마)(바)等, 設局撰集, 略成(사), 值丁酉之亂, 諸醫星散, 事遂(아).
厥後, 先王又教許浚獨爲撰成, 仍出內藏方書五百卷, 以資考據, 撰未半而龍馭賓天. 至聖上位之三年庚
戌. 浚始卒業而投進. 目之曰東醫寶鑑. 書凡二十五卷

10. (가)와 (나)에 들어갈 말을 순서대로 漢字로 적으시오

11. 다음 중 (다), (라), (마), (바)에 들어가지 않는 사람은?

- ① 楊禮壽
- ② 許任
- ③ 金應鐸
- ④ 李命源
- ⑤ 鄭禮男

19. 肝膽濕熱證과 가장 관련이 깊은 증상은?

- ① 口泛清水 ② 口苦泛惡
③ 幹嘔呃逆 ④ 嘔吐酸腐
⑤ 脇肋脹痛

20. 口淡乏味와 가장 관련이 깊은 證은?

- ①脾胃氣虛 ②脾胃濕熱
③肝胃不和 ④肝脾不和
⑤肝火上炎

21. 8歲의 男兒가 脘腹脹滿, 噯氣厭食, 噯出酸腐氣味, 大便不調, 苔厚膩, 脈滑을 나타낼 때 辨證은?

- ① 胃氣虛證 ② 濕熱蘊脾證
③ 食滯胃脘證 ④ 胃火熾盛證
⑤ 肝氣犯胃證

22. 다음 중 肝火上炎證과 肝陽上亢證의 공통 임상표현이 아닌 것은?

- ① 面紅目赤
② 頭暈目眩
③ 腰膝酸軟
④ 急躁易怒
⑤ 煩躁易怒

23. 脅肋胃脘脹痛, 噯氣易怒, 吞酸嘈雜, 情緒抑鬱, 飲食減少, 苔薄黃, 脈弦등을 辨證하면?

- ① 肝火上炎證
② 肝脾不和證
③ 肝胃不和證
④ 膽鬱痰擾證
⑤ 肝氣犯脾證

24. 다음 固體輔料들 중 그 性味가 다른 네 가지와 가장 차이가 큰 것은?

- [illegible]

25. 다음 약물의 配伍 중 相須와 거리가 먼 것을 고르시오

- ① 當歸와 川芎
② 人蔘과 五靈脂
③ 知母와 黃柏
④ 柴胡와 黃芩
⑤ 香附子와 川芎

26. 다음 중 설명이 잘못된 것은?

- ① 炒는 藥材를 용기에 넣고 균일한 火力으로 볶는 것이다
- ② 끓는 물에 단시간 삶는 방법을 燂法이라한다
- ③ 藥物을 약한 불로 간접 혹은 직접 가열하여 충분히 건조하는 것을 烘焙法이라한다
- ④ 藥物을 여러 겹의 종지로 싸서 가열하는 방법을 煨法이라한다
- ⑤ 煨하여 빨갛게 되면 일정한 액체보료 중에 넣어 炮製하는 방법은 悶煨法이다

27. 火製法 中 液體輔料와 함께 炒하여 輔料가 藥물조직 내부에 스며들게 하는 炮製방법은?

- ① 炒法 ② 炙法
③ 煨法 ④ 煨法
⑤ 湯法

28. 다음 중 옳은 것은?

- ① 肝欲散 急食辛以散之
② 心欲軟 急食甘以軟之
③ 脾欲緩 急食酸以軟之
④ 肺欲收 急食苦以收之
⑤ 腎欲堅 急食鹹以堅之

29. 本草學에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① <本草品匯精要>는 劉文泰 등이 편찬한 두 번째의 勅撰本草書籍이다
- ② 우리나라의 本草書로는 <鄉藥集成方>, <醫方類聚>, <東醫寶鑑>, <方藥合編>, <東醫壽世保元>이 있다
- ③ 실물에 근거하여 약물의 그림을 정밀하게 그려서 고대 本草圖解의 오류들을 수정하여 국내외 학자들이 매우 중시하는 책은 吳其濬의 <植物名實圖考>이다
- ④ 蘇頌은 <本草圖經>을 편찬하였고 唐愼微는 <經史證類備急本草>를 편찬하였다
- ⑤ 陶弘景의 撰述한 서적은 <名醫別錄>과 <本草拾遺>이다

30. 韓藥의 분류와 사용법에 대한 설명이다. 잘못된 것을 고르시오

- ① 開竅藥은 熱邪가 心包에 陷入하거나 痰濁이 清竅를 蒙蔽하여 된 神昏證과 驚癇中風 등의 갑작스런 昏厥에 사용한다
- ② 寒閉는 面靑身凉, 苔白脈遲 등 症으로 이때에는 溫開法에 祛寒行氣藥을 配伍한다
- ③ 虛證으로 인한 脫證은 神昏冷汗 肢冷 脈微欲絕 등이 나타나는데 이 때는 開竅藥이 아니라 回陽救逆法을 응용하여야 한다
- ④ 清虛熱藥에는 苦參 白鮮皮, 大豆黃卷 등이 있다
- ⑤ 瀉下藥에는 大黃 芒硝 蘆薈 등의 攻下藥, 火麻仁 郁李仁 등의 潤下藥, 甘遂 大戟 芫花 등의 峻下逐水藥이 있다

31. 祛邪法에 속하지 않는 것은 ?

- 가. 發汗 나. 涌吐 다. 攻下 라. 理氣
- ① 가나다 ② 가다
- ③ 나라 ④ 라
- ⑤ 가나다라

32. 塞因塞用은 어디에 활용하는가?

- 가. 脾虛腹脹 나. 血虛便秘 다. 腎虛癱閉 라. 血枯經閉
- ① 가나다 ② 가다
- ③ 나라 ④ 라
- ⑤ 가나다라

33. 既病防變하는 措置에는 어떤 것들이 있는가?

- 가. 早期診治 나. 調攝精神 다. 先安未受邪之地 라. 人工免役 응용
- ① 가나다 ② 가다
- ③ 나라 ④ 라
- ⑤ 가나다라

34. 瘀血阻滯로 인한 崩漏의 경우 考慮해야 할 가장 정확한 치법은?

- 가. 祛邪爲主 나. 扶正과 祛邪 兼用 다. 先扶正後祛邪 라. 先祛邪後扶正
- ① 가나다 ② 가다
- ③ 나라 ④ 라
- ⑤ 가나다라

가. 車前子 나. 犀角片 다. 朱砂 라. 旋覆花 마. 砂仁

- 동익 M스쿨