

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		<div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이 추가문제</div>	<div>1교시</div>	<div>감독관 확 인</div>
<div>시행 : 12월 26일(토)</div>		<div>수험번호</div>	<div>성 명</div>	<div>인</div>
<div>문항/시간</div>	<div>40문항(제한시간40분)</div>			

01. 頭痛 眩暈 耳聾 耳鳴 易怒 面紅目赤 口苦脇肋作痛 無惡寒發熱 변증하시오.

- ① 肝陽上亢
- ② 氣血兩虛
- ③ 肝膽濕熱
- ④ 表虛中風
- ⑤ 肝火上炎

02. 다음중 服藥시간으로 알맞은 것은?

1. 리노하는 약 - 아침
2. 낮- 보 비위
3. 보신양- 夜間
4. 간병약- 저녁

03. 望聞問節 에서 밑줄친 것과 일치하는 것은?

- ① 神
- ② 聖
- ③ 工
- ④ 巧
- ⑤ 拙

04. 동의수세보원 사 思四惡? 원문

1. 술을 좋아하는 사람은 여색을 좋아한다.
2. ○○을 좋아하는 사람은 ○○을 좋아한다

05. 太乙眞人の 七禁文주고 옳은 것은?

- ① 少言語 養()氣 / ② 戒色慾 養()氣 / ③ 薄滋味 養()氣 /
- ④ 嚙精液 養()氣 / ⑤ 莫瞋怒 養()氣 / ⑥ 美飲食 養()氣 / ⑦少思慮 養()氣

06. 다음중 旺相論에서 거울에 囚가 되는 臟으로 옳은 것은?

- ① 肝
- ② 心
- ③ 脾
- ④ 肺
- ⑤ 腎

18. 다음 치법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 塞因塞用은 閉塞不通의 假實 證候에 補益法, 收澁法을 사용
- ② 熱因熱用 : 以熱治熱 - 假熱症候에 溫熱法 사용
- ③ 寒因寒用 : 以寒治寒 - 假寒症候에 寒涼法 사용
- ④ 通因通用 : 通泄이 太過한 假實 證候에 通利法을 사용하여 치료
- ⑤ 反佐法: 用藥反佐, 服用反佐

19. 음양의 속성중 分化를 바르게 설명한 것은?

- ① 모든 대상의 내용물은 두 개로 나누어지며 두 개가 합일된때 본체가 완전해짐.
- ② 음과 양의 상대성의 관계가 연속되며 대비되는 상대에 따라 상태가 바뀌는 것.
- ③ 음양은 호근호용인 하나의 통일체라 할 수 있다.
- ④ 음양속에 다시 음양이 있다는 속성으로 대대의 복잡성을 설명한다.
- ⑤ 음양이 변화하는 상태에서도 평형의 상태가 유지되고 있다.

20. 다음 중 攻下法만을 쓸 수 있는 경우는?

- ① 열이 있고 조시가 있고 정기가 남아 있을때
- ② 원래 변비가 있는 사람이 장조가 오래되었을 때.
- ③ 표증이 있고 정기미약할때
- ④ 소양병 증세에 태양증이 있을때
- ⑤ 산후에 영혈이 부족할때

21. 다음중 脈象의 설명이 옳지 않은 것 골라라.

- ① 澁脈: 대나무를 칼로 가볍게 긁어 놓은 형상
- ② 滑脈 : 脈形往來流利圓滑, 無病脈(妊娠)
- ③ 芤脈 : 脈形如蔥管, 浮而無力, 按之中空
- ④ 牢脈 : 脈來大弦實, 沈按始得
- ⑤ 虛脈 : 脈來如按琴線

22. 다음은 五勞所傷 이다 틀린 것은?

- ① 久視傷血
- ② 久臥傷氣
- ③ 久坐傷精
- ④ 久立傷骨
- ⑤ 久行傷筋

23. 다음 중 濕의 특징으로 옳은것만 골라라.

- ① 하부를 잘 침범한다. ② 머리를 싸맨듯하다.
③ 몸의 열이 잘 떨어지지 않는다. ④ 기기를 막는다.
⑤ 습은 폐를 잘 손상시킨다.

24. 약물의 배오 중 효능을 제약받는경우에 해당하는 것은?

- ① 相須 ② 相使
③ 相畏 ④ 相惡
⑤ 相反

25. 아래는 약물의 修治法이다 틀린 것은?

- ① 蛤粉炒: 藥物の 淸熱化痰效果를 增強시킨다.
- ② 酒炙法: 藥性を 바꾸어 藥을 上行하게 한다.
- ③ 醋炙法: 疏肝, 活血止痛의 效能을 높인다.
- ④ 鹽炙法: 補肝腎의 效能을 높임. 治疔效果를 높임
- ⑤ 蜜炙法: 和胃止嘔, 祛痰止咳의 效能을 강하게 한다.

26. 命門학설과 주장한 醫家/醫書로 옳게 짝지어진 것은?

- ① 內經-命門
② 難經-右腎左命門
③ 虞搏-兩腎總號命門說
④ 張介賓-腎間動氣說
⑤ 孫一奎-精室

27.肝主疎泄이 失調되었을 때 나타나는 증상이 아닌 것은?

- ① 脇部脹痛 胸悶 善太息 婦女乳房脹痛(간울)
- ② 頭痛 眩暈 耳聾 耳鳴 易怒 面紅目赤 口苦脇肋作痛(간화상염)
- ③ 胃脘脹痛, 食少, 呃逆吞酸
- ④ 腹脹, 腹痛, 腸鳴, 泄瀉
- ⑤ 面色不華, 眩暈, 多夢, 耳鳴, 視物模糊, 肢體麻木, 爪甲不榮, 月經量少, 或 經閉

28. 炎夏多汗, 高熱時의口渴引飲하고 大熱傷津, 燒傷灼液하거나 陰虛勞熱하여 瘀血이 생겼다 이때 진액을 보충하여 瘀血을 치료 했다면 어떤 원리를 이용한것인가?

- ① 津枯血動 ② 津枯血燥
③ 增水行舟(진액부족 변비치료) ④ 津血同源
⑤ 血少津涸

① 逆治 ② 反治
③ 從治 ④ 正治
⑤ 順治

① 足厥陰 肝經
② 手少陰 心經
③ 足太陽 膀胱經
④ 足少陽 膽經
⑤ 足太陰 脾經