

	과목명	동제한의학 테스트 (6회)	한의학	감독관 확인

시행 :		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간					

- 太陽經에서 陽明經을 거치지 않고 少陽經으로 傳變할 경우처럼 病邪가 經을 뛰어넘어 傳變되는 것을 ()이라 하고, 外邪가 三陽經을 거치지 않고 바로 陰經의 症候群을 보일 경우를 ()라 한다
- 兩經이나 三經이 同時에 發病할 경우를 ()라하고, 一經의 症候가 아직 풀리지 않았는데 다른 經의 症候가 나타날 경우를 ()라 한다
- 太陽病 발생 후에 他經에 전하여 지는 것을 ()라 하고, 陽經과 陰經이 동시에 출현하는 것을 ()라 하며, 陽經에서 발병할 때 太陽病없이 바로 陽明證, 少陽證을 나타내는 것을 ()라 한다.
- 太陽病 發熱而渴 不惡寒者 爲() 若發汗已 身灼熱者 名()
- 風溫爲病, 脈陰陽俱浮, 自汗出, 身重, 多眠睡, 鼻息必鼾, 語言難出. 若被下者, () 若被火者() 若火熏之()
 ① 微發黃色, 劇則如驚癇, 時瘈瘲 ② 小便不利, 直視失溲 ③ 一逆尙引日, 再逆促命期.
- 不可發汗에 해당하지 않는 것은?
 ① 咽喉乾燥者 ② 淋家 ③ 瘡家 ④ 衄家 ⑤ 亡血家 ⑥ 汗家 ⑦ 胃中冷 ⑧ 答없음
- 淋家, 不可發汗, 汗出(). 瘡家雖身疼痛, 不可發汗, 汗出則() 衄家, 不可發汗, 汗出() 亡血家, 不可發汗, 發汗則() 汗家, 重發汗, ()
 ① 必便血 ② 瘧 ③ 必額上陷, 脈急緊, 直視不能眴, 不得眠.
 ④ 寒慄而振. ⑤ 必恍惚心亂, 小便已陰疼
- 桂枝湯을 복용할 때는 ()을 마셔서 藥力을 돕고 따뜻하게 보온. 지나친 發汗으로 正氣를 손상시켜서는 안된다.
- 太陽病 發熱 汗出 惡風 脈緩은 ()症이고 傷寒 太陽病 或已發熱 或未發熱 必惡寒 體痛 嘔逆 脈陰陽俱緊은 ()症이다.

10. 絞痛() 串痛() 掣痛() 重痛() 隱痛()

- ①痛處에 잡아당기는 느낌. 筋脈失養 氣機不通이 원인, 대부분 肝과 관련됨
- ②疼痛部位가 沈重한 느낌. 濕邪로 인해 氣機가 막혀 발생
- ③氣血不足, 氣虛弱으로 經脈氣血 運行이 澁滯. 은은하면서 면면히 이어짐
- ④痛症이 매우 劇烈, 견디기 어렵다. 疼痛의 범위가 매우 크다
- ⑤痛症部位가 游走. 經絡의 游走와 관련됨

11. 頭痛의 원인별 증상을 연계하시오

氣虛() 血虛() 腎虛() 脾虛() 血瘀() 痰濁() 食積() 肝火上炎()

- ①刺痛 ②嘔吐, 眩暈을 동반 ③惡心嘔吐, 心下痞悶을 동반
- ④脹痛, 口苦, 咽燥을 동반 ⑤隱隱, 過勞後 甚, ⑥眩暈, 面白을 동반
- ⑦腦髓空虛, 腰膝痠軟을 동반 ⑧自汗, 便溏을 동반

12. 頭項痛은 ()經病, 前額痛은 ()經病, 前頭痛은 ()經病, 頭側部痛은 ()經病, 頭頂痛은 ()經病, 頭痛에 동반되는 齒痛은 ()經病으로 본다

정답

1. 越經傳 直中
2. 合病 并病
3. 傳經 兩感 本經自發
4. 溫病 風溫
5. ② ① ③
6. ⑧
7. ①②③④⑤
8. 뜨거운 죽
9. 中風 傷寒
10. ④ ⑤ ① ② ③
11. ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④
12. 태양 양명 태음 소양厥음 소음