

시행 : 11월 13일(토)		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간	문항:				

한의학문제풀이(11회)

- 01.④
02.③
03.①③
04.⑤
05.④
06.⑤
07.④ 主氣(相火)가 客氣(土)를 生克하면 逆
08.③ 運: 水運/ 氣:濕土 氣克運
09. ③
10. ①
11. ⑤
12. ④
13. ④
- ※ 瀉心湯 비교
半夏瀉心湯 - 心下滿而不痛
生薑瀉心湯 - 心下痞 乾噦食臭
甘草瀉心湯 - 心下痞 下利 乾嘔 心煩
附子瀉心湯 - 心下痞 惡寒汗出(胃中蘊熱 兼表陽虛)
大黃黃連瀉心湯 - 心下痞(氣痞-實邪가 없어 만지면 濡) 脈關上浮
14. ①
15. ①
16. ①
17. ①
- ※ 痞滿燥實
痞 - 枳實, 滿 - 厚朴, 燥 - 芒硝, 實 - 大黃
大承氣湯 - 痞滿燥實證, 小承氣湯 - 痞滿便秘, 調胃承氣湯 - 潮熱便秘 燥實證

18. ②
19. ④
20. ②
① 일치한다 ③ 回刺, 分刺, 關刺 ④ 足中趾 ⑤ 양급과 음급이 바뀜
21. ③
22. ③ 交信→跗陽, 跗陽→交信, 復溜→築賓, 五樞→維道
23. ④
24. ⑤
25. ③
26. ②
27. ⑤
28. ③
29. ④
30. ⑤
31. ③
32. ②
33. ⑤

	巨 刺	繆 刺
發病 部位	病邪가 經脈에 있다.	病邪가 絡脈에 있다.
診斷 의 근거	病痛이 左側에 있으면 右側의 脈象에도 病理變化가 있다.	身體에 病痛이 있어도 三部의 脈象에는 病理變化가 없다.
刺鍼 部位	刺經. 左側에 有病하면 右側의 經穴을 取하고 右側에 有病하면 左側의 經穴을 取한다.	刺絡. 有關한 經脈의 四肢端의 井穴과 皮膚의 鬱血된 絡脈을 瀉한다.

34. ④
35. ①子午搗臼法 (선보후사)

36. ①

37. ②

已饑已渴→大泄之後

38. ①

39. ③

40. ③

한의학문제풀이(12회)

01. ④
02. ③
03. ②
04. ②
05. ④
06. ⑤
07. ①
08. ③
09. ③
10. ①
11. ③
12. ④
13. ④
14. ④
15. ③
16. ①
17. ③
18. ④
19. ①
20. ②
21. ③
22. ①
23. ③
24. ⑤
25. ②
26. ③
27. ④
28. ③
29. ④
30. ④
31. ③
32. ①

王燾 唐, 巢元方 隋, 王叔和 晉, 咎殷 唐, 全元起 隋

八裏脈：沈, 微, 緩, 瀦, 伏, 遲, 弱, 濡

< 運氣相臨 > (盛衰)

- 順化 : 氣生運 (司天之氣가 大運을 生) (六氣가 主, 五運이 次) = 氣候 변화가 平和
- 天刑 : 氣克運 (六氣가 主, 五運이 次) = 변화가 특히 極烈
- 小逆 : 運生氣 (五運이 主, 六氣가 次) = 변화가 비교적 淸
- 不和 : 運克氣 (五運이 主, 六氣가 次) = 변화가 비교적 淸

33. ④
34. ②
35. ②
36. ④
37. ④
38. ③
39. ④

	疾病	正邪	發病時期	病理 狀態	部位	證狀	治法
本	原因, 本質	正氣	先發(原發病) 舊病	眞證	裏證	本證 (主證)	原因治療
標	現象, 症候	邪氣	後病(續發病) 新病	假證	表證	兼證	對症治療

40. ③

한의학문제풀이(13회)

01. ③

02. ②⑦①④

03. ②

04. ②

05. ①②③④⑤⑥

06. ①②③

07. ②

08. ③

09. ①

10. ②

11. ②

12. ⑤

13. ③

14. ④

15. ⑤

16. ③

17. ③ 絲竹空→聽宮

18. ①

(素問 血氣形志)

形樂志苦, 病生於脈, 治之以灸刺;

形樂志樂, 病生於肉, 治之以鍼石;

形苦志樂, 病生於筋, 治之以熨引;

形苦志苦, 病生於咽嗌, 治之以百藥;

形數驚恐, 經絡不通, 病生於不仁, 治之以按摩醪藥. 是謂“五形志”也.

19. ③

20. ①

21. ④

22. ①

燥以乾之, 暑以蒸之, 風以動之, 濕以潤之, 寒以堅之, 火以溫之. 故風寒在下, 燥熱在上, 濕氣在中, 火遊行其間, 寒暑六入, 故令虛而化生也.

23. ③

【액(額)】 [액로(額顙)] [상(顙)] 이마. 눈썹 위에서 머리털이 난 데까지. (額: 이마 액) (顙:

이마 상)

【액각(額角)】 [두각(頭角)] 이마 구석. 이마의 양쪽 구석.

【정(庭)】 [천정(天庭)] [귓정(厥庭)] 앞이마. 이마 한가운데. (庭: 뜰 정)

【귓(闕)】 [귓중(闕中)] [인당(印堂)] 두눈썹 사이. (闕: 대귓문 귓)

【귓상(闕上)】 귓의 조금 윗부분.

【섭유(顙顙)】 [빈골(鬢骨)] [태양(太陽)] ①관자놀이. ②경외기혈(태양혈). 눈썹 바깥쪽 끝과 눈 바깥쪽 끝을 연결한 선의 가운데에서 뒤로 1촌 떨어진 곳. (顙: 관자놀이 섭) (顙: 관자놀이 유) (鬢: 살짝 빈) (살짝: 관자놀이와 귀 사이에 난 머리털.)

【알(頰)】 [산근(山根)] [왕궁(王宮)] [하극(下極)] 콧마루. 코뿌리. 좌우 눈구석의 가운데 부분. (頰: 콧마루 알) (마루: 지붕이나 산의 꼭대기)

【약속(約束)】 ①눈꺼풀. ②팔약근. (안륜근(眼輪筋)이나 향문팔약근 따위.)

24. ②

25. ④

26. ⑤

27. ①

28. ④

29. ⑤

30. ②

31. ⑤

32. ②

태과로 인해 상승 <素問 六節藏象論>의 未至而至此謂太過 薄所不勝而勝所勝也

33. ①

34. ②

35. ②

36. ①

37. ③

38. ①

藏於精而象於地→藏於陰而象於地

39.①

40.④

한의학문제풀이(14회)

01. ⑤
02. ②
03. ②
04. ②③
05. ②
06. ④
07. 治節
08. ①②
09. ④
10. ②
11. ④
12. ④
13. ⑤
14. ⑤
15. ④
16. ①
17. ②
18. ④
19. ④
20. ③
21. ②
22. ③
23. ③

* 九變刺：輸刺，遠道刺，經刺，絡刺 分刺，大瀉刺，毛刺，巨刺，焮刺
 九刺法（靈樞，官鍼）
 一曰輸刺，輸刺者，刺諸經榮輸藏腑也。
 二曰遠道刺，遠道刺者，病在上，取之下，刺府腧也。
 三曰經刺，經刺者，刺大經之結絡經分也。
 四曰絡刺，絡刺者，刺小絡之血脈也。
 五曰分刺，分刺者，刺分肉之間也。
 六曰大瀉刺，大瀉刺者，刺大膿以鉞鍼也。
 七曰毛刺，毛刺者，刺浮痺皮膚也。
 八曰巨刺，巨刺者，左取右，右取左。

九曰焮刺，焮刺者，刺燔鍼則取痺也。

24. ④
25. ①
26. ③
27. ④
28. ④
29. ①
30. ⑤
31. ②
32. ②
33. ③
34. ①
35. ②
36. ②
37. ①
38. ④
39. ④
40. ①

※五臟六腑 中 胞宮과 가장 밀접한 관계인 것은? 心肝脾(血液充養→月經발생)

<太乙眞人の 七禁文>

少言語 養內氣 / 戒色慾 養精氣 / 薄滋味 養血氣/

嚙精液 養臟氣/ 莫瞋怒 養肝氣/ 美飲食 養胃氣/ 少思慮 養心氣

< 五輪學說 >

肝-黑睛-筋精-風輪

心-大·小眇-血精-血輪

脾-上·下眼胞-肉精-肉輪

肺-白睛-氣精-氣輪

腎-瞳神-骨精-水輪

한의학문제풀이(15회)

01. ①
 02. ③④
 03. ④
 04. ③
 05. ③
 - 06.脾胃
 07. ③
 08. ④③
 09. ②
 10. ⑤
 11. ⑤
 12. ④
 13. ⑤
 14. ④
 15. ⑤
 16. ④
 17. ③, ④
 18. ②
 19. ②
 20. ①
 21. ⑤
 22. ②
 23. ⑤
 24. ①
 25. ③원인 ㉠ 熱病後期에 邪熱이 오래 머물러 陰을 손상㉡ 久病이 회복되지 않아 全身 精血陰津이 소모되어 발생
 26. ① 원인 ㉠ 情志所傷 ㉡ 肝鬱氣滯(肝失疏泄)
㉢ 中焦濕熱熏蒸하여 肝膽鬱熱化火하여 膽汁排泄장애
 27. ③
 28. ①
 29. ④
- 倉廩之本:脾胃大腸小腸三焦膀胱 cf)倉廩之官 :

脾胃

傳化之腑 : 大腸, 小腸, 胃, 膀胱, 三焦(素問 五藏別論)→天氣之所生

30. ⑤

31. ①

32. ③

33. ③

34. ④

35. ②

① 枳實은 미성숙한 과실을 채취한다

③ 旋覆花는 홍색으로 될 때 채취한다(활짝 피었을때)

④ 蒲黃은 아직 개화되지 않았을 때 채취한다(꽃핀후 수술에서 화분을 채취)

⑤ 地骨皮는 根皮를 사용하므로 봄 혹은 여름의 5~7월 開花 직후에 채집한다(地骨皮 牡丹皮 만 가을)

36. ④

九鍼

① 鑱鍼 : 1.6寸: 熱在頭身 病在皮膚 (陽氣瀉)

- (皮膚淺刺 頭部와 身體의 熱證을 治)

- (箭頭鍼으로 稱 오늘날 皮膚鍼)

② 圓鍼 : 1.6寸: 分肉間氣滿

- (圓頭鍼으로 稱 皮膚를 문질러 分肉間 氣滯를 治療 肌肉을 傷하지 않음)

③ 鍉鍼 : 3.5寸: 脈氣虛少

- (脈을 按壓함. 椎鍼과 비슷) (深入해서는 안됨 主按脈勿陷 以致其氣)

④ 鋒鍼 : 1.6寸: 壅熱出血 以發痼疾

- 瀉血→ 癰腫 熱病을 治 (오늘날 三稜鍼)

⑤ 鈹鍼 : 4寸 : 癰腫大膿出

- 劍形. 癰膿 등 外症의 割治에 사용 (오늘날 劍針 또는 割刀)

⑥ 圓利針 : 1.6寸: 病痺癰腫

- 癰腫痺證에 深刺함 (외과용 小眉刀 瀉血)

⑦ 毫鍼 : 3.6寸: 寒熱痛痺在經絡

- 寒熱 痛痺를 治 현재 임상에서 가장 많이
상용하는 鍼具

⑧ 長鍼 : 7寸: 深邪遠痺

- 環跳鍼으로 稱 芒鍼으로 응용

⑨ 大針 : 4寸: 以瀉機關之水

- 瀉水하는데 사용(水腫치료) 火鍼 巨鍼으로
발전

37. ①

38. ④

39. ④

40. ①