

한의학문제풀이(36회)

01. ④
02. ⑤
03. ⑥
04. ①
05. ②
06. ③
07. ③④
08. ④
09. ①
10. ④
11. ①
12. ②
13. ④
14. ①
15. ③
16. ④

十 劑	功效	處方例
宣	宣可去壅(울체를 흩어지게)	薑,橘之屬 二陳湯 瓜蒂散
通	通可去滯(막힌 것을 통하게)	防己之屬 十棗湯
補	補可去弱(허약을 건강하게)	人蔘,羊肉之屬 四君子湯
泄	去閉(막힌 것을 설사하게)	葶藶,大黃之屬 大承氣湯
輕	去實(외표로邪氣를 나가게)	麻黃,葛根之屬 麻黃湯
重	去怯(불안을鎮靜)	磁石,鐵粉之屬 朱砂安神丸
澀	去脫((빠져나가는 것 방지)	牡蠣,龍骨之屬 金鎖固精丸 養臟湯
滑	去着(邪가 응결된 것을 매끄럽게)	冬葵,榆皮之屬 葵子散 麻子仁丸
燥	祛濕(濕을 제거)	桑白皮,赤小豆 二妙丸
濕	去枯(津血고갈을 滋潤)	瓊玉膏

17. ⑤
18. ③

19. ③

諺解痘瘡集要, 諺解救急方, 諺解胎產集要(1601년)
東醫寶鑑(1610년), 辟疫神方(1613년)

20. ④ 關元穴 臍下 4寸

21. ③

22. ③

23. ④

※本草綱目과 이동원 <東垣十書>의 藥物歸經

手太陰經: 桔梗 升麻 蒼朮 葛根(白芷 蔥白)

足太陰經: 白芍藥 升麻 蒼朮 葛根

手太陽經: 羌活 藁本 黃柏

足太陽經: 黃柏 羌活

手陽明經: 白芷 升麻 石膏

足陽明經: 石膏 白芷 升麻 葛根

手少陰經: 獨活 黃連 細辛

足少陰經: 知母 獨活 桔梗 細辛

手少陽經: 柴胡 連翹 地骨皮(上) 青皮(中) 附子
(下) 足少陽經: 青皮 柴胡

手厥陰經: 柴胡 牡丹皮

足厥陰經: 青皮 柴胡 川芎 吳茱萸

24. ②

25. ②

26. 芩, 洪, 弦, 革

27. ④

28. ⑤

29. ②

30. 眞牙

31. ① 潮熱 盜汗 五心煩熱 顴紅 口舌乾燥 心煩
眩暈 不眠 脈細數

32. ③

33. 3.5.2.4.1

34. ③

35. ⑤

36. ④

37. ⑤

38. ⑤

39. ④

40. ③

한의학문제풀이(37회)

01. ①
02. ③④
03. ②③
04. ③
05. ④
06. ②④
07. ②④
08. ③
09. ②
10. ④
11. ①
12. ③
13. ②
14. ⑤
15. ⑤
16. ⑤
17. ⑤
18. ①
19. ②
20. ③
21. ③
22. 典醫監 惠民署 內醫院
23. ③
24. ②
25. ③
26. 咽塞、嗜食而不得下
27. ②
28. ⑤
29. ④
30. 대저 생명체를 죽여서 살기를 구하는 것은 '살리는 것(살림)'과의 거리가 더욱 먼 것이다
31. ②
32. ④
33. ③
34. 膽, 大腸, 小腸 膀胱, 三焦, 命門

35. c, a, d, b, e, g, f, h, j, i, k

36. ⑤

37. 眞中風: 풍한의 외감 사기에 감수되어 발병한 것
類中風: 火氣濕 등의 원인으로 발병하여 갑자기 쓰러져 인사불성하거나 반신불수가 되는 증상 등을 동반하는 병증

醫家: 王履

38. 火 氣 濕

39. 肺, 心包, 葉桂

40. 獨行, 相須, 相使, 相惡, 相畏, 相反, 相殺

한의학문제풀이(38회)

01. ①
02. ③
03. ③⑤
04. ②③
05. ④⑤
06. ①②③⑤/①③⑤⑥
07. ②④
08. ④⑤
09. ④
10. ④
11. ⑤
12. ②
13. ①
14. ①
15. ②
16. ①
17. ⑤
18. ①
19. ⑤
20. ③
21. ②
22. ⑤
23. ②
24. ④
25. ②
26. ①
27. ④
28. ⑤
29. ②
30. ③
31. ①
32. ⑤ 心爲聲音之主 肺爲聲音之門 腎爲聲音之根
33. ①
34. ②
35. ⑤

36. ⑥ 驚則心無所依 神無所歸 慮無所定 故氣亂矣
37. ①
38. ②
39. ②
40. ⑤

한의학문제풀이(39회)

01. ①

02. ③

03. ②③⑤

04. ②

05. ③⑤

06. ⑤③

07. ①②④

08. ③④⑤⑥

09. ②

10. ⑤

11. ⑤

12. ③

1) 酒炙法

① 藥性を 바꾸어 藥을 上行하게 한다.(술의 升提의 作用을 빌어서 藥을 上行하게 하며, 上焦의 邪熱을 清한다.ex, 黃連, 大黃 等)

② 活血通絡의 效能을 높인다. (ex, 當歸, 川芎 等) ③ 矯臭效果를 나타낸다.(ex, 烏梢蛇)

2) 醋炙法 : 藥物을 씻거나 細切한 後에 一定量의 食醋와 함께 炒하는 方法.

① 疏肝, 活血止痛의 效能을 높인다.(ex, 乳香, 沒藥, 三棱, 莪朮, 柴胡, 香附子, 青皮, 玄胡索 等)

② 毒性을 없애고 副作用을 減少시킨다.(ex, 大戟, 甘遂, 芫花, 商陸 等)

③ 矯臭矯味の 效果가 있다. (ex, 五靈脂, 乳香, 沒藥)

3) 鹽炙法 : 藥物을 씻거나 細切한 後 一定量의 食鹽水와 함께 炒하는 方法.

① 藥을 下行하게 하여 治療效果를 높인다

a.補肝腎의 效能을 높임 (ex,杜冲, 巴戟, 補骨脂 等の 補腎藥) b.治疔效果를 높임 (ex,小茴香, 橘核, 荔枝核 等)

c.利尿效果를 높임 (ex,車前子 등)

② 滋陰降火의 作用이 강해진다.(ex, 知母, 黃柏 等)

4) 薑炙法 : 藥物을 씻거나 細切한 後 一定量의 薑汁과 함께 섞어서 炒하거나 끓이는等으로 處理하는 方法.

① 和胃止嘔, 祛痰止咳의 效能을 강하게 한다.(ex, 黃連, 竹茹) ② 副作用을 緩和하여 治療效果를 높인다.(ex, 厚朴)

5) 蜜炙法 : 씻거나 細切한 藥物을 一定量의 煉蜜과 함께 炒하는 方法.

① 潤肺止咳의 作用을 강하게 한다.(ex, 麻黃, 百部根, 款冬花, 紫蘇, 枇杷葉)

② 補脾益氣의 作用을 강하게 한다.(ex, 黃芪, 甘草)

③ 藥性を 緩和한다.(ex, 麻黃) ④ 矯味の 效果가 생기고 副作用을 除去한다.(ex, 馬兜鈴)

6) 油炙法 : 잘 씻어서 細切한 藥物을 一定量의 食用油에 넣고 加熱하는 方法.(麻油, 羊脂, 菜油, 蕎油)

① 治療效果를 높인다. (ex,淫羊藿 溫腎壯陽의 效能이 높아진다) ② 粉碎하기 쉽다. (ex,虎骨, 豹骨, 蛤蚧)

13. ⑤

14. ④

15. ②

胸部的 氣街 : 胸前 兩方의 膺部(또는 胸部的 募穴)와 心俞.肺俞 : 背俞穴, 腹募穴

16. ③

17. ①

18. ⑤

19. ②

20. ⑤

舌形 - 粗老舌(實,熱證), 細嫩舌(虛, 寒證), 肥大舌(重舌-心脾熱盛과 濕熱內盛) 瘦薄舌(瘦癯舌-氣血兩虛, 陰虛火旺), 裂紋舌(熱盛傷津,氣血兩虛) 齒痕舌(虛證), 芒刺舌(熱邪亢盛)

21. ⑤

22. ①

- 23. ③
- 24. ①
- 25. ③
- 26. ③
- 27. ②
- 28. ①②③
- 29. ④
- 30. ①
- 31. ③
- 32. ⑤
- 33. ⑤命門의 外候 : 命堂(明堂, 印堂)
- 34. ③
- 35. ⑤
- 36. ①
- 37. ④
- 38. ④
- 39. ②
- 40. ⑤

한의학문제풀이(40회)

01. ②

02. ②

03. ②④

04. ③④⑤⑥

05. ③

06. ④⑤

07. ①③

08. ①②③④⑤

09. ②

10. ①

11. ③

12. ③

13. ②

14. ③

15. ③

16. ⑤

17. ④

18. ④

19. ③

20. ⑤

21. ②

22. ①

23. ②

24. ④

25. ②

26. ②

27. ①

28. ①

29. ④

30. ②③⑥

31. ⑤

32. ②

33. ①②

34. ③

35. ①

36. ④

37. ②

38. ①

39. ③

40. ④⑤