

\* 이동원 <東垣十書>의 諸經으로의 引經藥(괄호안의 내용은 本草綱目)

手太陰經：桔梗 升麻 蒼朮 葛根(白芷 蔥白)

足太陰經：白芍藥 升麻 蒼朮 葛根

手太陽經：羌活 藁本 黃柏

足太陽經：黃柏 羌活

手陽明經：白芷 升麻 石膏

足陽明經：石膏 白芷 升麻 葛根

手少陰經：獨活 黃連 細辛

足少陰經：知母 獨活 桔梗 細辛(肉桂)

手少陽經：柴胡 連翹 地骨皮(上) 青皮(中) 附子(下)

足少陽經：青皮 柴胡

手厥陰經：柴胡 牡丹皮

足厥陰經：青皮 柴胡 川芎 吳茱萸

예) ★ 頭痛 引經藥：川芎은 모든 頭痛의 필수 引經藥, 太陽頭痛은 蔓荊子, 陽明頭痛은 白芷, 太陰頭痛(前頭痛)은 半夏, 少陰頭痛(두통이 齒에 까지 통증)은 細辛, 厥陰頭痛은 吳茱萸, 顛頂頭痛은 藁本

#### \* 藥物의 七情

한가지 혹은 두 가지 이상의 藥物을 配合했을 때의 藥物 相互間의 작용기전을 말한다.

1) 單行：한가지의 藥物로 疾病을 治療하는 것. ; (例) 獨蓼湯, 獨附湯

2) 相須：效能이 유사한 藥物을 配合했을 때 協同작용을 일으켜 원래의 功效 增加.

(君藥과 臣藥이 되어 서로 보조하여 효과 增強 - 둘다 主)

(例) 石膏 + 知母 柴胡 + 黃芩 知母 + 黃柏  
人參 + 甘草 當歸 + 川芎 蓮子肉 + 山藥

3) 相使：두 藥物이 配伍될 때 한 藥物이 다른 藥物의 主作用을 補助하는 것(主從관계형성).

(我之佐使) (例) 黃芪(主) + 茯苓 艾葉 + 香附子  
黃芩(主) + 大黃 前胡 + 半夏

4) 相惡：藥性を 合用시 상호 견제하여 藥物의 작용을 감소시키는 것.(人參惡萊菔子)

(奪我之能) (例) 黃連 + 生薑 防風 + 乾薑 人參 + 萊菔子  
白芍藥 + 石斛 川芎 + 黃連 厚朴 + 澤瀉

5) 相畏：藥物을 合用 時 한 약물의 毒性이나 烈性反應을 다른 약물이 抑制, 減少시킴

(受彼之制) (半夏畏生薑-半夏의 입장)(人參畏五靈脂)

(例) 半夏 + 生薑 細辛 + 滑石 麥門冬 + 苦參

6) 相殺(쇄)：한 藥物이 다른 藥物의 毒性을 없애는 것.(生薑殺半夏-생강의 입장)

(制彼之毒) (例) 防風 + 附子 白芷 + 石雄黃 石葦 + 丹砂

7) 相反：藥物을 合用 後 인체에 강렬한 毒性반응이나 副作用을 일으키는 것.

(例) 地黃 + 萊菔子 胡黃連 + 玄參 甘草 + 大戟, 甘遂

※ 藥性이 강해지는 경우：相須 相使

藥性이 약해지는 경우：相惡

毒性이 약해지는 경우：相畏 相殺(쇄)

毒性이 강해지는 경우：相反