

11. 다음은 亢害承制에 대한 설명이다. 옳은 것은?

가. 相生中에 相克이 있고, 相克中에 相生이 있음으로써 그 相對平衡을 유지할 수 있다.

나. 亢則害承乃制 制則生化로 五行간의 制化를 설명한다.

다. 亢은 亢盛을, 承은 防禦를, 制는 抑制 혹은 制限, 節制를 뜻한다.

라. 臟腑간의 相互制約의 生理現象을 설명하는 이론이다.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

12. 다음의 설명이 옳은 것은?

가. 支飲 - 四肢에 水飲이 停留된 것

나. 懸飲 - 脇肋作痛을 유발하고, 牽引作痛, 脇肋脹滿, 氣短 등의 症을 발생시킴

다. 溢飲 - 胸膈에 水飲이 停留된 것

라. 痰飲 - 狹義의 痰飲으로 腸胃之間에 水液이 停留된 것

- [illegible]

13. 奇經八脈에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 대부분 十二經脈에서 分出된 비교적 큰 支脈으로 臟腑와의 屬絡關係가 있다

나. 十二經脈을 分類하고 組合시키며 主導한다

다. 奇經은 肝胃女子胞腦髓 등과 관련이 없다

라. 十二經脈의 氣血에 대하여 滲灌하고 溢蓄하는 調節作用을 한다

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라 ⑥ 답 없음

14. 다음 중 足太陽膀胱經의 攢竹穴의 위치는?

- ① 内眥 ② 外眥
③ 人中 ④ 尾閤
⑤ 眉本

15. 다음 중 燥邪犯肺證과 肺陰虛證에서 같이 나타나는 증상이 아닌 것은?

- ① 幹咳痰少
② 痰粘難咯
③ 胸脇滿悶
④ 舌幹少津
⑤ 發熱惡風

16. 다음 중 陰虛風動證과 가장 관계가 먼 증상은?

- ① 手足蠕動
② 角弓反張
③ 眩暈
④ 舌紅少津
⑤ 筋攣肉瞤

17. 약국에서 아르바이트를 하는 신예은씨(22세)가 전날 밤 야식을 먹고 腹痛, 裏急後重, 下利赤白粘液 등을 주 증상으로 호소하며 한의원을 찾아왔다. 알맞은 辨證은 무엇인가?

- ① 肝脾不和證
② 脾氣虛證
③ 脾腎陽虛證
④ 肝膽濕熱證
⑤ 大腸濕熱證

18.心悸,氣短이 다음 중 어떤 증상과 동반할 때,心陽虛證으로 진단할 수 있는가?

- ① 神疲乏力 ② 面色淡白而消瘦
③ 形寒肢冷 ④ 頭暈目眩
⑤ 心胸痞悶

19. 다음 중 脾氣虛、脾陽虛、脾氣下陷、脾不統血證의 공통된 증상은 무엇인가?

- ①畏寒肢冷
②食少便溏
③便血衄血，月經量多
④腹部疼痛，喜溫喜按
⑤脘腹重墜，食後益甚

- ① 炒는 藥材를 용기에 넣고 균일한 火力로 볶는 것이다
- ② 끓는 물에 단시간 삶는 방법을 燂法이라한다
- ③ 藥物을 약한 불로 간접 혹은 직접 가열하여 충분히 건조하는 것을 烘焙法이라한다
- ④ 藥物을 여러 겹의 종지로 싸서 가열하는 방법을 煨法이라한다
- ⑤ 煨하여 빨갛게 되면 일정한 액체보료 중에 넣어 炮製하는 방법은 悶煨法이다

① 炒法 ② 炙法
③ 煨法 ④ 煨法
⑤ 湯法

① 肝欲散 急食辛以散之
② 心欲軟 急食甘以軟之
③ 脾欲緩 急食酸以軟之
④ 肺欲收 急食苦以收之
⑤ 腎欲堅 急食鹹以堅之

明代의 의사이다. 字는 健齋이다. 南豐사람이다. 外感(外感) · 內傷(內傷) · 雜病(雜病) 및 임상各科의 諸病을 論술하였는데 簡便明瞭하고 알기 쉬우며, 의학 공부 방식에 대한 論술이 꽤 懇懇하여 의학 보급에 대하여 어느 정도 촉진 作用을 하였다. 그러나 ‘의학은 유학에서 나왔다’라고 지나치게 강조하고 의학을 배우기 전에 반드시 유학 이론 등을 속속들이 잘 알아야 한다고 생각하여 지나침과 치우침에서 벗어나지 못하였다.

異名: 活血藤(활혈등), 紅藤(홍등), 血風藤(혈풍등)

味: 苦(苦) 甘(甘)

歸經: 肝(肝) 心(心) 脾(脾) 腎(腎)

主治: 血虛經閉, 風濕痺痛, 痛經, 肢體癱瘓, 月經不調, 月經過少, 手足麻木, 關節痠痛

藥用部位: 줄기

效能: 補血, 舒筋活絡, 活血化瘀

13회 한의학 문제풀이 정답

문항	정답
1	234
2	3
3	345
4	2
5	4
6	2345
7	2
8	3
9	3
10	4
11	5
12	3
13	3
14	5
15	5
16	2
17	5
18	3
19	2
20	1
21	3
22	3
23	4
24	3
25	2
26	5 煨淬法
27	2
28	1
29	이천 [李梴]
30	계혈등 [鷄血藤]