

<div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div>	<div> <div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이</div> </div>	<div> <div>한의학</div> </div>	<div> <div>감독관</div> <div>확 인</div> </div>
---	---	-----------------------------	--

2022. 11. 27 - 24회		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

01. 五音を 五行의 相生 순서대로 배열하면?

- ① 角商宮徵羽

② 角商宮羽徵
- ③ 宮商角徵羽

④ 角徵宮商羽
- ⑤ 宮商羽角徵

02. 人體의 有邪를 五行의 相生 순서대로 배열하면?

- ① 腋肘臑股肘

② 肘股肘臑腋
- ③ 腋肘股肘臑

④ 股肘腋肘臑
- ⑤ 肘腋肘臑股

03. 動物을 五畜으로 분류했을 때 五行의 相生 순서대로 배열하면?

- ① 羊牛馬雞彘

② 雞羊牛馬彘
- ③ 牛馬彘雞羊

④ 馬彘雞羊牛
- ⑤ 彘雞羊牛馬

04. 生之本, 神之變也; 其華在面, 其充在血脈에 해당되는 五臟은?

- ① 肝

② 心
- ③ 脾

④ 肺
- ⑤ 腎

05. 氣之本, 魄之處也; 其華在毛, 其充在皮에 해당되는 五臟은?

- ① 肝

② 心
- ③ 脾

④ 肺
- ⑤ 腎

11. 다음 중 食滯胃腸證의 診斷 근거가 되는 主要한 것은 무엇인가 ?

- ① 大便秘結
② 矢氣則痛減
③ 便臭如敗卵
④ 惡心嘔吐
⑤ 苔膩、脈數

12. 山査, 麥芽, 蘿菔子の 공통 歸經은 어디인가?

- ① 心經 ② 腎經
③ 肝經 ④ 脾經
⑤ 小腸經

13. 다음 중 四君子湯의 구성이 아닌 것은?

- ① 人參 ② 白朮
③ 茯苓 ④ 熟地黃
⑤ 甘草

14. 다음 중 陽中之陽에 해당하는 것은?

- ① 精
③ 血
⑤ 津液
- ② 氣
④ 神

15. 다음腎의 병리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 腎陰虛하여 肝陰을 滋養하지 못하면 肝陽上亢과 더 심하면 肝風內動을 초래할 수 있다
- ② 腎陰虛하면 心火上炎을 초래할 수 있다
- ③ 腎陽虛하면 內傷寒濕 혹은 水氣氾濫을 초래할 수 있다
- ④ 命門相火過亢이면 烘熱, 때로 汗出, 性情煩燥, 性機能亢進, 陽痿등의 증상이 나타날 수 있다
- ⑤ 腎精虧虛하면 神衰, 智力減退, 動作遲鈍등이 나타날 수 있다

21. 心기능은 혀에 반영되는데 望舌에 대한 설명이 올바른 것은?

- ① 濕入心 - 黃苔
- ② 熱入心 - 舌生芒刺
- ③ 風熱入心 - 舌腫脹胖大
- ④ 濕熱入心於脾 - 舌堅
- ⑤ 心脾熱盛 - 細嫩舌

22. 다음 頭痛에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 氣虛頭痛은 頭痛이 隱隱하며 過勞뒤에 더 심해진다.
- ② 血虛頭痛은 眩暈과 面白증상이 동반된다
- ③ 脾虛頭痛은 頭痛이 暈沉하면서 嘔吐와 自汗증상이 있고 便溏症이 동반된다
- ④ 痰濁頭痛은 嘔吐와 眩暈증상이 동반된다
- ⑤ 肝火上炎에 의한 頭痛은 頭部에 脹痛이 있으며 口苦, 咽乾이 동반된다

23. 다음 중 巨刺에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

- ① 內經의 九變刺의 한 종류이다.
- ② 痛症이 左側에 있으면 右側의 脈象에도 病理變化가 있다.
- ③ 病邪가 絡脈에 있다.
- ④ 巨刺법의 目的은 調陰陽이다.
- ⑤ 左側에 有病하면 右側의 經穴을 取한다.

24. 다음 12경맥의 流注에서 빈곳에 알맞은 것으로 올바른 것은?

肝足厥陰之脈起於大指叢毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝()交出太陰之後上膈內廉 循股陰入毛中過陰器抵少腹挾胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頤頰連目系上出額與()會於巔其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注()

- ① 3寸 - 任脈 - 心
- ② 5寸 - 膽經 - 肝
- ③ 8寸 - 膀胱經 - 膽
- ④ 8寸 - 督脈 - 肺
- ⑤ 7寸 - 督脈 - 肺

25. 다음 骨度法 내용으로 올바른 것은?

가. 肘橫紋-腕關節橫紋 12寸

나. 前腋橫紋頭 - 肘橫紋 9촌

다. 橫骨上廉 - 內輔骨上廉(股骨內上踝) 18寸

라. 髀樞 - 膝中 18寸

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

26. 病因에 대한 歷代 醫家들의 설명 중 연결이 잘못된 것은?

- ① 春秋時代의 의사였던 龔和는 질병을 일으키는 六氣를 “陰陽風雨晦明”이라 하였다
- ② 漢의 張仲景은 <內經>에 기초하여 病因을 3가지로 구분하였고 “千般疹難不越三條”라 하였다
- ③ <內經>시기에는 強烈한 전염성의 致病要因을 인식하지 못하였지만 隨代의 <諸病源候論>이나 明代 吳有性の <溫熱論>등에는 “疫癘”나 “異氣” “戾氣”등에 대한 記述이 있다
- ④ 王清任은 瘀血을 衄血함에 체내 病理產物이 轉化하여 致病의 원인이 된다고 하였다
- ⑤ 모두 옳다

27. 다음 중 表證의 臨床 表現으로 옳은 것 2개를 고르시오 AE

- ① 脈浮
- ② 舌紅苔白
- ③ 身熱不揚
- ④ 寒熱往來
- ⑤ 惡寒發熱

28. 다음은 어떤 醫家에 대한 설명이다. 이 醫家는 누구인지 漢字 또는 한글로 쓰시오.

北宋의 이름 난 소아과 학자이다. 자(字)는 仲陽이다. 운주(鄆州: 지금의 산둥성(山東省) 동평(東平)) 사람이다. 어린 나이에 아버지를 여의고 홀로 되었기에 고모가 거두어 키웠다. 어른이 된 뒤에 고모부 여씨(呂氏)를 따라 의학을 배웠는데 힘써 깊이 파고들고 임상 실천을 중시하여 뛰어난 소아과 의사가 되었다. 산둥성(山東省) 일대에서 크게 이름을 떨쳤다. 나중에 1078~1085년[원풍(元豐) 연간]에 잇따라 장공주(長公主) 및 황자(皇子)의 병을 치료하자 한림의학(翰林醫學)을 내려 주었으며, 또 일찍이 태의승(太醫丞)을 지냈다. 나중에 병을 핑계 삼아 벼슬에서 물러났다.

그는 오로지 소아과에 60년간 종사하면서 풍부한 임상 경험을 쌓았는데 흔히 볼 수 있는 얼마간의 어린이 질병의 진단·예방과 치료에 대하여 모두 한 걸음 더 발전시켰다. 또한 어린이 병리(病理)의 특징을 근거로 하여 오장(五臟)을 버리로 삼은 소아과 변증(辨證) 방법을 총결하였으며, 치료에 있어서 부드럽고 윤기 있는 원칙을 주장하고 보(補)와 사(瀉)를 아울러 같이 써야 한다고 힘주어 말하였다. 옛 사람의 경험에 얽매이지 않았으며, 고방(古方)을 시대에 맞게 새롭게 만드는 것과 신방(新方)을 처음 만드는 데에 뛰어났다. 그의 이론·임상 경험과 의료 기록(medical records)을 염효충(閻孝忠)이 정리하여 1114년[정화(政和) 4년]에 엮었는데 중국 소아과의 발전에 대하여 크나큰 이바지를 하였다.

29. 다음은 어떤 醫家에 대한 설명이다. 이 醫家는 누구인지 漢字 또는 한글로 쓰시오.

隋唐 시대의 의학자이다. 본적(本籍)은 분명하지 않다. 대업(大業) 연간(605~616)에 일찍이 태의시어(太醫侍御)를 지냈고 명망이 매우 높았다. 《황제내경태소(黃帝內經太素)》30권을 지었고 《내경(內經)》을 주해(注解)한 맨 처음 의사의 하나로 뒷세상의 《내경》연구에 대하여 꽤 큰 이바지를 하였다. 그러나 그는 절맥(切脈) 진단 방면에서, 뒷세상의 몇몇 사람이 터무니없는 태소맥(太素脈)을 왜곡하고 변화 발전시켜 양상선이 논술한 맥진(脈診)의 본뜻을 잃어버리고 나쁜 영향을 빚게 만들었다.

30. 다음은 어떤 本草에 대한 설명이다. 이 本草의 이름을 漢字 또는 한글로 쓰시오.

異名: 烏賊骨(오적골), 烏賊魚骨(오적어골)

味: 함(鹹)

歸經: 간(肝) 신(腎)

主治: 潰瘍久不愈合, 衄血, 帶下過多, 便血, 崩漏, 消化器潰瘍, 濕疹, 外傷出血, 胃酸過多, 胃痛吞酸, 遺精, 陰蝕爛瘡, 早泄, 瘡多膿汁, 吐血, 下血, 虛寒下痢

藥用部位: 껍질

禁忌: 藥性이 微溫하므로 傷陰助熱할 수 있어서 陰虛多熱의 경우에는 복용해서는 안 된다.

子宮內膜炎에 依한 出血과 血熱로 因한 出血 및 胃酸不足으로 因한 胃痛에는 服用을 忌한다.

效能: 帶, 滲腸止瀉, 收斂止血, 收濕斂瘡生肌, 制酸止痛

24회 한의학 문제풀이 정답

문항	정답
1	4
2	3
3	2
4	2
5	4
6	5
7	1
8	3
9	3
10	1
11	3
12	4
13	4
14	4
15	4
16	1
17	2
18	4
19	4
20	3
21	2
22	3
23	3
24	4
25	1
26	5
27	15
28	전을 [錢乙]
29	양상선 [楊上善]
30	해표초 [海螵蛸]