

	<div>과목명</div> <div>한의학문제풀이정답 (1회~5회)</div>	<div>한의학시험</div>	<div>감독관 확인</div>
---	---	------------------	-----------------------

시행 : 12월 4일(일)		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간	문항:				

## 한의학문제풀이(1회)

01. ②
02. ③
03. ② 陽虛 -> 陰虛
04. ③ 노루-->사슴
05. ③
06. ⑤
07. ⑤ 血熱 [증치회보(證治匯補)]에 나옴. 혈분에 열이 있는 것. 혈분열(血分熱)이라고도 함. 증상은 피를 게우거나 코피를 흘리거나 기침을 하면 피가 나오거나 위에서 피가 나오거나 오줌에서 피가 나는 것을 비롯하여 오후에 열이 오르고 여자는 월경이 앞당겨지며 맥이 현삭(弦數)하다. 치료는 양혈(涼血)을 해야 한다.
08. ④
09. ③ 津液의 生成과 輸布代謝의 中樞的 역할을 하는 장부 : 脾
10. ③
11. 답없음
12. ① -5번은 驚에 대한 설명
13. ②
14. ①
15. ④
16. ③-膽實證: 勇敢, 易怒, 多睡
17. ②
18. ② 從後來者爲虛邪 從前來者爲實邪 從所不勝來者爲賊邪 從所勝來者爲微邪 自病者爲正邪
19. ② 寒邪凝滯收引
20. ①
21. ① 經筋 ② 絡脈 ③ 皮部 ⑤ 經別
22. ⑤
23. ⑤ 清熱瀉火藥
24. ③
25. ②

26. ④
27. ③ / ① 물질적 속성 ② 의식적 속성
28. ④
29. ①
30. ④

## 한의학문제풀이(2회)

01. ④

02. ④

03. ⑤

04. ⑤

05. ④ 痛者 寒氣多也 有寒故痛也<素問\*痺論>

06. ①, ⑦

07. ②

08. ③

我는 旺(王相之任): 같은 기운에 힘입어 기능을 최대한 발현함

生我者는 相(則生): 本體에 滋養을 받아 기능을 활발히 발휘하는 時空

克我者는 死(克): 자기를 克하는 氣運에 의해 기능이 사라지고 정지함

我克者는 囚(圍人): 相侮의 氣運에 의해 기능을 발휘하지 못하고 억압됨

我生者는 休:引하는 氣運에 의해 원활히 기능을 발휘함

	旺	相	死	囚	休
춘	목	화	토	금	수
하	화	토	금	수	목
장하	토	금	수	목	화
추	금	수	목	화	토
동	수	목	화	토	금

09. ①

五運三氣之紀

平氣	敷和(부화)	升明(승명)	備化(비화)	審平(심평)	靜順(정순)
太過之氣	發生(발생)	赫曦(혁희)	敦阜(둔부)	堅成(건성)	流衍(유연)
不及之氣	委和(위화)	伏明(복명)	卑監(비감)	從革(종혁)	涸流(학류)

목 : 양의시작 음중지양

화 : 양이 극한상태 양중지양

토 : 음양을 포괄 생화만물

금 : 음의 시작 양중지음

수 : 음이 극한상태 음중지음

10. ⑥

11. ③

12. ④

13. ①

14. ②

15. ③

16. ③

17. ⑤ 命門

18. ②

神 - 兩精相搏 謂之神. 神者 精氣之化成.

魂 - 隨神往來者 謂之魂. 魂者 神氣之輔弼也.

魄 - 竝精而出入者 謂之魄. 魄者 精氣之匡佐也

19. ② <醫學發明>의 저자 李杲

20. ②

21. ④

22. ④

23. ③

24. ④

25. ①

26. ②

27. ④

28. ④

29. ①

30. ④

31. ⑤

## 한의학문제풀이(3회)

01. ②
02. ③
03. ③②①
04. ④ 가. 火 나. 水 다. 土 라. 金
05. ② ③
06. 腎 腎 脾
07. ①
08. 治神/調氣
09. ③
10. ③ 가-魂, 나-神, 다-志, 라-神
11. ③
12. ②
13. ②
14. ⑤

호침의 기초 침자법

1) 雙手進鍼法 : 좌우수를 함께 사용하여 침을 자입하는 방법.  
자침부위와 침의 장단에 따라 다음과 같이 나뉨

(1) 指切進鍼法

- 좌수의 조갑으로 혈위상을 누르고, 우수에 권 침을 조갑에 꼭 붙여 피부에 자입.
- 단침을 기육이 두터운 곳의 혈위에 자입할 경우 사용

(2) 挾持進鍼法

- 좌수로 침체의 하단을 마주잡아 지탱하며 침침을 노출시키고, 우수로 침병을 잡아 침체가 혈위를 향해 수직이 되도록 하여 자침을 하는 것.
- 장침으로 기육이 두터운 부위를 자입할 경우 사용

(3) 舒張進鍼法

- 피부의 일부분을 손가락으로 뺏뺏하게 편 후 자침.
- 피부가 늘어져 있는 곳이나 주름이 있는 부위의 혈위에 자침시 사용. 장침을 심자할 때 응용

(4) 摘取進鍼法

- 좌수로 피부를 집어 들어올린 후 우수로 침을 잡아 적취한 혈위에 자침.
- 얼굴부위의 혈위와 같은 피육이 얇은 부위에 자입할 경우 사용

2) 單手進鍼法 : 좌수의 모지, 식지로 침병을 쥐고, 중지끝은 혈위에, 중지의 지복에 침침과 침체의 하단을 지지후 자입. 호침 사용 시 많이 쓰며, 아울러 指切 舒張 摘取 進鍼法을 함께 사용

3) 管鍼進鍼法(鍼管法)은 진침시 동통감소를 위한 것으로 침 관을 만들어 押手를 대신함

15. ①
16. ②
17. ①
18. ③
19. ④
20. ②
21. ①

臟	筋	骨	血	腑	脈	髓	氣
會	會	會	會	會	會	會	會
章	陽	大	膈	中	太	絕	膻
門	陵	杼	俞	腕	淵	骨	中
泉							

22. ①②
23. ⑤
24. ①
25. ④
26. ①
27. ②
28. ⑤ 苦
29. ④
30. ④

- 味過於酸 肝氣以津<sup>1)</sup> 脾氣乃絕
- 味過於鹹 大骨氣勞<sup>2)</sup> 短肌<sup>3)</sup> 心氣抑
- 味過於甘 心氣喘滿<sup>4)</sup> 色黑 腎氣不衡
- 味過於苦 脾氣不濡 胃氣乃厚<sup>5)</sup>
- 味過於辛 筋脈沮弛<sup>6)</sup> 精神乃央

- 1) 津 : 溢
- 2) 大骨氣勞 골기가 손상되다
- 3) 短肌 기육이 쪼그라들다
- 4) 喘滿 가슴이 답답하고 숨이 차다
- 5) 厚 : 脹滿
- 6) 沮弛 이완되다

## 한의학문제풀이(4회)

1. ⑤
2. ⑤
3. ① 陰病治陽 陽病治陰 (壯水制陽 益火消陰) (益火之源以消陰翳 壯水之主以制陽光)- 對立制約
4. ④ 陰盛格陽은 對立制約이 안되어 일어난다
5. ③
6. ③
7. ④
8. ④
9. ②
10. ④
11. ⑤ 寒氣生濁 熱氣生清 清氣在下 則生飧泄 濁氣在上 則生臌脹 此는 陰陽反作 病之從逆也
12. ② 滲諸陰 → 滲諸陽
13. ③
14. ②

肺 11	大腸 20	胃 45	脾 21
心 9	小腸 19	膀胱 67	腎 27
心包 9	三焦 23	膽 44	肝 14
任脈 24	督脈 28		

15. ①
16. ⑤
17. ① 和
18. ④ 충강 56
19. ①

陰陽의 속성

(1) 全一

모든 대상의 내용물은 두 개로 나누어지며 두 개가合一될 때 그 본체는 완전한 상태를 이루는 全一의 속성이 있다.

(2) 待對

어떤 사물이든 모두 상대적으로 존재하며 그 일정한 속성은 陰과 陽의 두 방면으로 나뉜다. 이 상대성의 관계가 연속되면서 대비되는 상대에 따라 상태가 바뀌는 待對의 속성을 지닌

(3) 統一

陰陽의 상호관계를 관찰하면 陰陽은 相互同根인 하

나의 통일체라 할 수 있다. (全一은 陰陽이 분화되기 이전의 모습이고 統一은 陰陽이 분화된 후를 나타낸다.)

(4) 分化

陰陽 속에 다시 陰陽이 있다는 속성, 모든 사물에 내재하는 상호 대립의 연결. 즉 待對의 복잡성을 설명

(5) 消長

陰陽의 상대적 관계는 정지한 것이 아니라 계속하여 相互對抗 相互作用하여 進退消長の 현상을 나타낸다. 따라서 모든 사물에는 반드시 陰陽의 消長변화가 있으며 변화하는 상태에서도 평형의 상태가 유지되고 있다.

20. ①

21. ②

○ 胃는 음식이 모이는 곳인데 그에 해당하는 유혈이 위로는 기가혈(氣街穴)이고 아래로는 족삼리혈이다.

○ 衝脈은 12경맥이 모이는 곳인데 그에 해당하는 유혈이 위로는 대저혈이고 아래로는 거허혈(巨虛穴)의 상렬혈과 하렬혈이다.

○ 臍中은 기가 모이는 곳인데 그에 해당하는 유혈이 위로는 주골(柱骨) 위에 있고 아래에 있는 것은 인영혈이다.

○ 뇌는 골수가 모이는 곳인데 그에 해당하는 유혈이 위로는 윗머리에 있고 아래에 있는 것은 풍부혈이다. 윗머리란 백회혈(百會穴)이다[영추].

22. ③

23. ⑤

24. ③ 其色多青則痛, 多黑則痺, 黃赤則熱, 多白則寒, 五色皆見, 則寒熱也,

25. ③ 山藥(보기약)

26. ②

27. ⑤ 問曰 四飲何以爲異 師曰 其人素盛今瘦. 水走腸間 漉漉有聲 謂之痰飲 飲後水流在脇下 咳唾引痛 謂之懸飲 飲水流行 歸于四肢 當汗出而不汗出 身體疼重 謂之溢飲 咳逆倚息短氣不得臥 其形如腫 謂之支飲

28. ④ 食療本草 唐·孟詵

29. ④ 小腸實熱證 - 泄瀉, 尿赤灼痛 : 心移熱于小腸 (小便黃赤, 口舌糜爛疼痛)

(膀胱濕熱 또한 尿頻, 尿急, 尿痛 誘發 가능)

30. ④

## 한의학문제풀이(5회)

01. ①

02. ②

03. ③

04. ④

05. ⑤

06. ④ 傳化之府-胃, 大腸, 小腸, 三焦, 膀胱  
形藏四 - 頭角 耳目 口齒 胸中

07. ③

經絡의 3대 작용

① 生理的 : 運輸작용 - 氣血을 運行시키고 身體를 滋養하는 作用

② 病理的 : 反應작용 - 인체의 異常을 反映하는 作用

③ 治療的 : 傳導작용 - 侵襲病邪나 鍼灸刺戟 등을 傳導하는 作用

08. ④

09. ②

10. ③

11. ②

경	폐	심포	심	대장	삼초	소장
募穴	中府	膻中	巨闕	天樞	石門	關元
경	비	간	신	위	담	방
募穴	章門	期門	京門	中脘	日月	中極

12. ①

13. ①

14. ③

九鍼

① 鑱鍼 : 1.6寸 : 熱在頭身 病在皮膚 (陽氣瀉)

(皮膚淺刺 頭部와 身體의 熱證을 治)

(箭頭鍼으로 稱 오늘날 皮膚鍼)

② 圓鍼 : 1.6寸 : 分肉間氣滿

(圓頭鍼으로 稱 皮膚를 문질러 分肉間 氣滯를 治療 肌肉을 傷하지 않음)

③ 鍉鍼 : 3.5寸 : 脈氣虛少

(脈을 按壓함. 椎鍼과 비슷) (深入해서는 안됨 主按 脈勿陷 以致其氣)

④ 鋒鍼 : 1.6寸 : 壅熱出血 以發痼疾

瀉血→ 癰腫 熱病을 治 (오늘날 三稜鍼)

⑤ 鈹鍼 : 4寸 : 癰腫大膿出

劍形. 癰腫 등 外症의 割治에 사용 (오늘날 劍針 또는 割刀)

⑥ 圓利針 : 1.6寸 : 病痺癰腫

癰腫痺證에 深刺함 (외과용 小眉刀 瀉血)

⑦ 毫鍼 : 3.6寸 : 寒熱痛痺在經絡

寒熱 痛痺를 治 현재 임상에서 가장 많이 상용하는 鍼具

⑧ 長鍼 : 7寸 : 深邪遠痺

環跳鍼으로 稱 芒鍼으로 응용

⑨ 大針 : 4寸 : 以瀉機關之水

瀉水하는데 사용(水腫치료) 火鍼 巨鍼으로 발전

15. ③ 白痞 : 피부 표면에 나타난 白色의 작은 顆粒 모양으로 안에는 水液을 포함하는 것이 粟처럼 두 명하고, 皮膚의 표면에 높게 솟아 있고 터진 후에는 물이 흐르는 것

16. ④

17. ①

18. ④

19. ⑤

20. ③ 陳復正 <幼幼集成>

21. ②

22. ④

23. ④

24. ② 腎之合骨也 其榮髮也

25. ④

26. ④

27. ④

28. ④

29. ④

30. ②