

한의학문제풀이(17회)

01. ①

02. ④

※ 瀉心湯 비교

半夏瀉心湯 - 心下滿而不痛

生薑瀉心湯 - 心下痞 乾噫食臭

甘草瀉心湯 - 心下痞 下利 乾嘔 心煩

附子瀉心湯 - 心下痞 惡寒汗出(胃中蘊熱 兼表陽虛)

大黃黃連瀉心湯 - 心下痞(氣痞-實邪가 없어 만지면濡) 脈關上浮

03. ③

♠ 白通湯 : 총백 6g 건강 3g 부자 3g

少陰病, 下利, 脈微, 厥逆無脈, 乾嘔煩

평소에 眞陽이 부족해 外邪가 안으로 들어가

陰寒이 왕성해지고 腎關이 不固해져 설사를 한다.

寒邪가 胃를 공격하여 嘔吐를 하게 되고 양기가

밖으로 나가지 못해 손발이 차가워지고 맥이

미약해진다. 구토와 설사를 함께하여 眞陽이 더욱

허해져 陽氣가 위로 밀려나니 煩燥하여

불안해진다. 이라서 戴陽證이라 칭한다.

04. ③

05. ④

06. ⑤

07. ②

08. ⑤

09. ④

10. ① 子午搗臼法 (선보후사)

11. ①

12. ② 已饑已渴→大泄之後

13. ①

14. ③

15. ③

16. ④

17. ②

18. ③

19. ④

20. ⑤

21. ①

22. ②

23. ②

24. ④

25. ①

26. ④

27. ④

28. ⑤

29. ①

30. ⑤

	巨 刺	繆 刺
發病部位	病邪가 經脈에 있다.	病邪가 絡脈에 있다.
診斷의 근거	病痛이 左側에 있으면 右側의 脈象에도 病理變化가 있다.	身體에 病痛이 있어도 三部의 脈象에는 病理變化가 없다.
刺鍼部位	刺經. 左側에 有病하면 右側의 經穴을 取하고 右側에 有病하면 左側의 經穴을 取한다.	刺絡. 有關한 經脈의 四肢端의 井穴과 皮膚의 鬱血된 絡脈을 瀉한다.