

<div> <div>동의M스쿨</div> <div>과목명</div> <div>한의학총강 문제풀이 (10회)</div> </div>			감독관 확 인
<div> <div>시행: 6월 4일(일)</div> <div>문항/시간</div> <div>문항:</div> </div>		수험번호	성 명
			인

01. 六經辨證에서 心腎虛衰로 虛寒爲主의 증상이 나타나나 虛熱로도 顛倒되며 四逆湯과 黃連阿膠湯을 主方으로 하는 단계는?

- ① 太陽病

② 少陽病
- ③ 太陰病

④ 少陰病
- ⑤ 厥陰病

02. 傷寒 六經傳變에서 三陽經 통한 傳變 없이 바로 陰證이 출현하는 것, 즉 三陰證이 바로 출현하는 것은?

- ① 直中

② 本經自發
- ③ 并病

④ 合病
- ⑤ 兩感

03. 다음의 傷寒과 溫病에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 傷寒은 대부분 皮毛를 통하여 入하고 먼저 足太陽膀胱經으로 들어온다
- ② 傷寒의 脈象은 주로 浮緊, 溫病의 脈象은 浮數하다
- ③ 傷寒은 溫病에 비해 惡寒, 頭身痛이 비교적 심하다
- ④ 初期에 傷寒은 辛溫解表, 溫病은 辛涼解表 위주로 치료한다
- ⑤ 溫病은 易于傷陽한다

04. 少陰病, 下利清穀, 裡寒外熱, 手足厥逆, 脈微欲絕, 身反不惡寒, 其人面色赤, 或腹痛, 或乾嘔, 或咽痛, 或利止脈不出者, 通脈回逆湯主之 과 가장 관련 깊은 것은?

- ① 熱因熱用

② 寒因寒用
- ③ 塞因塞用

④ 通因通用
- ⑤ 熱者寒之

05. 食不下 自利益甚 時腹自痛 若下之 必胸下結硬과 가장 관계 깊은 병증은?

- ① 太陽病

② 少陽病
- ③ 太陰病

④ 少陰病
- ⑤ 厥陰病

11. 傷寒論에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 廣義의 傷寒은 모든 外感熱病을 通稱, 狹義의 傷寒은 外感風寒 邪氣가 일으킨 병증을 말한다

나. 傷寒論이 編著된 시대는 後漢時代다

다. 陽經과 陰經에 병이 동시에 출현하는 것을 兩感이라 이른다

라. 合病은 先後의 구분 있으나 并病에는 先後의 구분이 없다

- | | |
|-----------|---------|
| ① 가 나 | ② 가 나 다 |
| ③ 가 나 라 | ④ 다 라 |
| ⑤ 가 나 다 라 | |

12. 水飲停滯하고 食滯하여 心下痞硬, 下利, 噯氣腐臭, 腹中雷鳴 등의 증상 동반시 가장 적절한 방제는?

- | | |
|---------|-----------|
| ① 甘草瀉心湯 | ② 大黃黃連瀉心湯 |
| ③ 生薑瀉心湯 | ④ 附子瀉心湯 |
| ⑤ 半夏瀉心湯 | |

13. 陽明病 不可攻下의 경우라 가장 알맞게 짝지어진 것은?

가. 表邪가 아직 풀리지 않은 경우

나. 病邪가 上部에서 盛하고 아직 腑로 완전히 들어가지 않아 嘔多, 心下硬滿

다. 腑實은 형성되지 않고 無形의 邪熱이 經絡을 鬱閉하여 얼굴색이 온통 붉을 때

라. 胃氣가 虛寒하여 不能食하는 경우나 腑實은 있으나 營血虛少를 겸하여 脈象이 微澁한 경우

- | | |
|-----------|-------|
| ① 가 나 다 | ② 가 다 |
| ③ 나 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가 나 다 라 | |

14. 다음 중 少陽病 증상과 가장 거리가 먼 것은?

- | | |
|---------------|--------|
| ① 口苦 咽乾 目眩 | ② 往來寒熱 |
| ③ 胸脇苦滿 默默不欲飲食 | ④ 心煩喜嘔 |
| ⑤ 脈細數 | |

15. 다음 중 發熱, 不惡寒而惡熱, 口渴, 口苦, 小便黃赤, 脈數, 舌苔黃 或 黃白相兼과 가장 관계 깊은 것은?

- | | |
|-------|-------|
| ① 衛分證 | ② 氣分證 |
| ③ 營分證 | ④ 血分證 |
| ⑤ 濕熱證 | |

