

제3회 동의엠스쿨 전국모의고사 (한의학)

시행: 2023. 10. 28

문항: 40

시간: 60分

성명:

01. 다음 대화에서 잘못된 의학사 지식을 가진 사람은 모두 몇 명인지 고르시오.

두식: 三因極一病證方論을 쓴 陳言은 宋代의 대표적 의가로 運氣學의 영향을 받았어.

미현: 宋慈는 1247년에 無冤錄이란 法醫學書를 간행 했어.

주원: 證治要訣을 저술한 戴元禮는 痘因으로 六鬱을 주장했는데 그건 氣, 濕, 痰, 血, 寒, 熱이야.

봉석: 張三錫이 醫學六要를 저술한 시기는 清代야.

희수: 紫虛脈訣을 쓴 崔嘉彥과 集驗背疽方을 쓴 李迅은 같은 왕조의 사람인지?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

02. 다음이 설명하는 인물은 누구인지 고르시오.

字는 中行이고 安徽城 歙縣 출신으로 明代 嘉靖 2년에 태어나 萬曆 21년까지 살았다. 그는 의학을 배울 때 적지 않은 시련을 겪었다. 그는 『傷寒論』을 수십 년 동안 연구하여 萬曆 20년에 마침내 결실을 맺을 수 있었다. 그는 王叔和와 成無己의 『傷寒論』의 錯簡을 주장하며 처음으로 교정하여 대표적 傷寒論 연구가가 되었다. 그의 학술 사상은 크게 3가지로 주목할 수 있는데, 첫째, 『傷寒論』의 錯簡에 대한 강력한 주장, 둘째, 『傷寒論』 교정에 사용한 削, 改, 移, 調의 방식, 셋째로 『傷寒論』은 傷寒病의 치료에만 국한되지 않는다고 주장한 점이 있다.

- ① 陳念祖
- ② 朱肱
- ③ 柯琴
- ④ 方有執
- ⑤ 張卿子

03. 다음은 醫家들이 세운 학설과 그 학파에 속한 의가들이다. 잘못 연결한 것을 고르시오.

- ① 攻邪學派: 張從正, 常德, 李子範, 麻九疇
- ② 溫病學派: 吳有性, 戴天章, 葉天士, 薛生白, 王孟英
- ③ 溫補學派: 薛己, 孫一奎, 趙獻可, 張介賓, 李中梓
- ④ 易水學派: 張元素, 李杲, 張璧, 張石禎, 王好古
- ⑤ 丹溪學派: 朱震亨, 戴思恭, 王履, 王綸

04. 다음 한국의 의학사에 대한 설명으로 옳은 기술은 모두 몇 개인지 고르시오.

(가) 삼국시대 때 德來와 知聰은 高句麗 태생으로 일본에 건너가 의술을 펼쳤고, 신라의 金武는 일본왕을 치료한 기록이 있다.

(나) 고려 光宗은 후주에서 귀화한 雙冀의 건의를 받아들여 醫學科舉를 실시하였고, 忠烈王 때의 薛景成은 元世祖를 치료하여 이름이 높아졌다.

(다) 조선의 三醫司는 內醫院, 典醫監, 惠民署이고, 그 중 惠民署가 醫女를 양성했다.

(라) 白光炫은 조선 明宗 때의 治腫醫로 治腫指南을 저술하였는데, 특히 《실록》에는 “白光炫은 종기를 잘 치료해 많은 奇效가 있으니, 세상에서 神醫라 일컬었다.”라고 쓰여 있다.

(마) 조선시대에는 麻疹과 관련된 의사들이 많이 나왔는데, 대표적으로 李元豐은 麻疹奇方, 李獻吉은 麻疹彙成, 劉爾泰는 麻疹篇을 저술했다.

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개
- ⑤ 5개

05. 다음은 服藥法에 대한 간략한 服藥指導이다. 바르게 설명한 것을 고르시오.

보통은 食前에 복용합니다. ①胃腸에 자극을 주는 약 물과 眼科의 질병을 치료하는 약물 역시 食前에 복용하시고, ⑤補益藥은 소화가 용이한 적당량의 음식과 함께 복용하세요. ②虛疾을 치료하는 약물은 發作後에 복용하고, ④鷄鳴散은 날이 샌 直後 공복에 복용하고, ⑥安神藥物은 취침 前에 복용하세요. 急病은 시간에 구애받지 않고 복용하고, 만성병은 일정한 시간에 복용해야 합니다.

- ① ①
- ② ②
- ③ ③
- ④ ④
- ⑤ ⑤

06. 다음은 方劑의 命名法과 그에 대한 설명이다. 잘못 설명한 것을 고르시오.

- ① 색깔로 命名한 경우: 紅升丹은 組成 후 색깔이 紅色이고, 金黃散의 경우 金黃色임을 나타낸다.
- ② 부분으로 命名한 경우: 三子養親湯은 3종류의 씨앗을 이용했고, 五皮飲은 5가지 약물의 껌질을 이용하였다.
- ③ 君藥과 效能을 결합하여 命名한 경우: 黃連解毒湯의 경우 君藥이 黃連이며 濉火解毒의 작용이 있다.
- ④ 組成藥物의 數量으로 命名한 경우: 二妙散, 十全大補湯, 八珍湯, 四物湯 등이 있다.
- ⑤ 藥物의 分量比例로 命名한 경우: 六一散의 경우 甘草 6兩 대 滑石 1兩으로 구성한다.

07. 다음은 어떤 약재에 대한 설명이다. 이 약재가 무엇인지 고르시오.

두릅나무과에 속한 다년생초본인 ()의 根으로, 일명 花旗蓼으로 불린다. 3~6년생을 가을철에 채취하여 가는 뿌리를 제거하고 햇볕에 건조한 것을 쓴다. 마른 뿌리는 약간 원기둥 모양을 이루고 방추형, 길이는 2~6cm, 굵기는 0.5~1cm이고, 표면에는 좁은 가로 주름과 불규칙한 세로 주름을 띠며, 정단에는 좁은 무늬가 촘촘하고 고리 모양의 주름이 있다. 性味는 寒苦·微甘하고, 心·肺·腎經으로 歸經한다. 补氣養陰·清熱生津하여 肺腎陰虛·氣陰兩虛·津液虧虛·腸熱便血 등을 치료한다.

- ① 人蔘
- ② 西洋蔘
- ③ 苦蔘
- ④ 沙蔘
- ⑤ 玄蔘

08. 다음은 어떤 약재에 대한 설명이다. 이 약재가 무엇인지 고르시오.

菊花科에 속하는 一年生 또는 二年生 草本로 가을철 꽃이 완전히 피었을 때 채취하여 老莖을 제거한 다음 陰乾한다. 性味는 寒苦·辛하고, 芳香하며 清熱解暑·除蒸·截瘧하는 효능을 가진다. 肝·膽 二經에 들어가, 苦寒은 清熱하고 辛味와 芳香은 發散하여 肝膽과 血分之熱을 清泄하고 陰分의 伏熱을 透出하는 清熱, 涼血, 退蒸의 良藥이 된다. 특히 이 중 '截瘧' 효능을 현대 약리학적으로 해석한 중국의 屠呦呦는 이 약재를 이용하여 말라리아 치료제 개발로 2015년 노벨생리학·의학상을 수상하였다.

- ① 青蒿
- ② 旋覆花
- ③ 野菊花
- ④ 委陵菜
- ⑤ 胡黃蓮

09. 다음은 어떤 약재에 대한 설명이다. 빈 칸에 들어갈 약재의 약용부위로 올바른 것을 고르시오.

柿蒂科에 속한 落葉喬木인 柿의 ()로, 가을에 성숙한 감을 채취하여 曬乾한다. 性味는 平苦·澀하고, 降逆下氣·治呃逆한다. 苦하므로 逆氣를 잘 내려 呃逆을 치료하는 要藥으로 胃寒氣逆에 사용한다. 또한 清熱鎮降의 藥을 배합하여 胃熱呃逆을 치료하기도 한다.

- ① 葉
- ② 果
- ③ 種子
- ④ 樹皮
- ⑤ 宿存萼

10. 다음은 金元四大家 중 한 명인 張從正에 대한 설명이다. 바르게 설명한 것을 고르시오.

ㄱ. 字는 子和, 號는 戴人이고 睞州 考城사람으로 宛丘에 오래 살았기에 宛丘子라고도 불린다. 그는 『儒門事親』 15권을 지었는데, 序文에 “其曰儒門事親者, 則以爲惟儒者能明其理, 而事親者當知醫也.”라 하여 그의 사상이 儒學的 바탕이 있음을 밝히고 있다.

ㄴ. 張從正의 학술사상은 첫째로 『內徑』과 『傷寒論』에 기반을 두어, 그의 질병관은 『素問·評熱病論』의 “正氣存內 邪不可干”이라는 관점과 일치하며, 『傷寒論』으로부터 “余常用張長沙汗吐下三法”이라 하였다. 둘째로 劉完素의 학술사상으로부터 영향을 받았는데, 張從正是 그의 私淑弟子로, 劉完素는 火熱을 주장하여 주로 辛涼한 藥으로 清散시켰고, 張從正은 劉完素의 견해에 攻하는 것을 힘써서 더욱 발전시켰다.

ㄷ. 張從正이 세운 학파가 형성된 사회적 원인은 河間學派와 크게 다르지 않은데, 이 의가는 劉完素보다 46세 연하로 동시대인이다. 그 당시 빈번한 전쟁으로 溫疫이 광범하게 유행하였고 和劑局方의 성행으로 辛溫한 芳香性 약물을 남용하는 악습이 남아 俗醫들은 “好補而惡瀉, 喜溫而畏寒, 大黃芒硝, 視如蛇蝎, 乾薑附子, 視如飴蜜”하였다.

ㄹ. 그가 주로 사용한 汗吐下三法 중 汗法의 경우, 辛溫한 약재만 發汗시킬 수 있는 것이 아니라, 辛涼한 약재들도 發汗시킬 수 있다고 여겼으며, 邪氣가 肌表에 침입하여 아직 깊이 들어가지 않은 경우에 사용하였고, 辛溫劑의 경우 麻黃湯과 桂枝湯을, 辛涼劑의 경우 防風通聖散과 雙解散을 통용하였다. 吐法의 경우, 吐法의 위험성에 주목하여 그가 주장한 범위를 매우 국한시켜 引涎, 滉涎, 嘘氣 등을 배제하였고, 傷寒頭痛에는 瓜蒂散, 雜病頭痛에는 蔥根白豆豉湯을, 發狂에는 三聖散을 사용하였다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

11. ()에 공통으로 들어갈 병증으로 가장 알맞은 것은?

- 痘人身冷 脈沈細而疾 煩躁而不飲水者()也.
- ()大虛證也. 身熱而脈不鼓擊 或身冷而欲坐井中 欲漱水而不入口 非真熱也.
- 所謂煩躁者 謂先煩漸至躁也. 所謂躁煩者 謂先發躁迨 連復煩也. 從煩至躁爲熱 未有不漸煩而躁者也. 先躁後 煩 謂怫怫然更作躁悶 此爲()也.
- 治(). 附子(炮)、乾薑(炮)、人參、陳皮、麥門冬、五味子、甘草(炙)、臘茶 各一錢. 右剉 作一貼 以清 泥漿二盞同煎去滓 入蜜五匙調和 放冷服之. 取汗爲效.

- ① 陽盛隔陰
- ② 亡陽
- ③ 陰盛隔陽
- ④ 亡陰
- ⑤ 心脾氣血陽虛

12. 다음 중 五行 相克에 관한 내용으로 올바른 것은?

- ① 木得金而伐
- ② 火得水而絕
- ③ 土得木而缺
- ④ 金得火而滅
- ⑤ 水得土而達

13. 30대 여성 환자가 흉협부 통증으로 한방병원을 내원했다. X-ray 촬영 후 진단 소견이 아래와 같을 때, 이에 대한 한의 학적 병명으로 가장 알맞은 것은?

- 흉막 삼출증(삼출성 흉막염), 늑골횡경막각 둔화, 측와(側臥) 시 유출액이 보임.

- ① 溢飲
- ② 留飲
- ③ 懸飲
- ④ 支飲
- ⑤ 流飲

14. ()不泄 歸()于肝而化清血의 빈칸에 공통으로 들어갈 글자는?

- ① 血
- ② 神
- ③ 津液
- ④ 氣
- ⑤ 精

15. 心腎不交의 변증 요점으로 가장 알맞게 짹지어진 것은?

- 가. 心陽虛 나. 心火旺 다. 腎陽虛 라. 腎陰虛

- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 가, 라
- ④ 나, 다
- ⑤ 나, 라

16. 다음 중 魂의 작용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 새로운 정보의 습득
- ② 기억의 회상
- ③ 새로운 아이디어
- ④ 계획의 수립
- ⑤ 창작활동

17. 다음 중 甲辰년의 五運六氣에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 歲會이며 동시에 同天符에 해당한다
- ② 司天의 右間氣는 順에 해당한다
- ③ 在泉의 右間氣는 順에 해당한다
- ④ 歲運 기준, 한 해 동안 濕氣가 流行할 가능성성이 높다
- ⑤ 運氣相臨은 不和에 해당한다

18. ‘上有氣海 曰膻中也 其治在(), 中有水穀氣血之海 曰()也 其治在(), 下有氣海 曰丹田也 其治在()’에 들어갈 내용을 순서대로 알맞게 짹지은 것은?

- ① 心, 中氣, 脾胃, 腎
- ② 肺, 營氣, 脾胃, 肝
- ③ 心, 營氣, 脾胃, 肝
- ④ 肺, 營氣, 脾胃, 腎
- ⑤ 肺, 中氣, 脾胃, 腎

19. 다음 중 鴻南補北法과 가장 관계 깊은 痘證은?

- ① 腎陰虛而相火妄動
- ② 腎陰虛而心火旺
- ③ 心陰虛而心陽亢
- ④ 腎陰虛而肝陽上亢
- ⑤ 腎陽虛損而心火浮越

20. 見痰休治痰而治氣의 이론적 기초로 가장 알맞은 것은?

- ① 氣津同源
- ② 津能載氣
- ③ 氣能攝津
- ④ 氣能行津
- ⑤ 氣能生津

21. 다음 중 通行諸臟之精氣 氣則爲陽 流行臟腑 宣發腠理에 해당하는 것은?

- ① 肝
- ② 脾
- ③ 肺
- ④ 三焦
- ⑤ 腎

22. 다음 중 腰背部에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 腰者 脾之府 轉搖不能 脾將憊矣
- ② 胸推 肩骨에서 尾骶骨까지는 21節이며 길이는 3尺에 해당한다
- ③ 背部 三關 가운데 上關은 腦後 玉沈關이다
- ④ 背者 胸中之府 背曲肩隨 府將壞矣
- ⑤ 背部 三關 가운데 下關은 脊椎 18節의 轆轤關이다

23. 다음 설명에 부합하는 穴位는?

- 穴位根據: 從通谷行足小指外側 去爪甲角如葷葉
- 頭部 痘症 및 眼病, 鼻病에 활용
- 矯正胎位 효과가 있으며 難產에 활용
- 皮膚痛瘍 및 급성 腰部 捏挫에 효과

- ① 厥兌
- ② 大敦
- ③ 至陰
- ④ 隱白
- ⑤ 少澤

24. 다음 중 <素問 氣穴論>에 ‘溢奇邪 通營衛’의 작용을 한다고 명시된 것은?

- ① 浮絡
- ② 別絡
- ③ 孫絡
- ④ 奇經
- ⑤ 皮部

25. 養生과 관련해 아래 문장이 지칭하는 대상으로 가장 적절한 것을 고르시오.

- 天地를 거느리고 陰陽의 법칙을 파악하여 精氣를 호흡하고 스스로 精神을 지키며 肌肉이 일정함.

- ① 上古之人
- ② 眞人
- ③ 至人
- ④ 聖人
- ⑤ 賢人

26. 다음 중 肺系, 咽喉, 胸膈 치료와 가장 관련 깊은 穴位는?

- ① 足臨泣
- ② 後谿
- ③ 照海
- ④ 內關
- ⑤ 申脈

27. 五行補瀉 鍼法 관련, 다음 중 肺氣虛損의 경우 补法을 사용해야 할 穴位로 가장 알맞은 것은?

- ① 魚際
- ② 神門
- ③ 少府
- ④ 太白
- ⑤ 大敦

28. 다음 중 杯弓蛇影과 가장 관계 깊은 養生法은?

- ① 疑惑解消法
- ② 悲鬱發泄法
- ③ 驚恐避脫法
- ④ 以情勝情法
- ⑤ 移情易性法

29. 한의원을 찾은 환자가 大便秘結, 热結旁流, 腹滿硬痛拒按, 不能食, 潮熱譴語, 脈沈有力 등의 증상을 보일 때 가장 알맞은 辨證은?

- ① 陽明實證
- ② 热實結胸證
- ③ 厥陰熱利證
- ④ 陽明熱證
- ⑤ 少陰熱化證

30. 다음 중 三陰交에 대한 설명으로 바르게 짹지어진 것은?

- 가. 膝下三寸 骰骨外 위치
- 나. 足內踝上 三寸 위치
- 다. 足太陰, 足少陰, 足厥陰 三脈之會
- 라. 妊產婦에 禁針穴로 慎用
- 마. 足少陰腎經에 소속

- ① 가 나 다
- ② 나 다 라
- ③ 가 다 마
- ④ 나 다 마
- ⑤ 나 라 마

31. 經脈 流注 上 ’起於小指之端 循手外側 上腕 出踝中‘하는 經脈은?

- ① 手太陰肺經
- ② 手陽明大腸經
- ③ 手少陰心經
- ④ 手太陽小腸經
- ⑤ 手少陽三焦經

32. 鍼刺法과 관련하여 <靈樞> 五奪不可瀉에 해당하지 않는 것은?

- ① 形肉已奪
- ② 大饑渴
- ③ 大奪血
- ④ 大汗出
- ⑤ 新產下血

33. 七表脈 中 하나로, 氣隨血脫에 의해 血脈이 氣血의 充盈과 鼓動을喪失했을 때 보일 수 있는 脈象은?

- | | |
|------|------|
| ① 弦脈 | ② 滑脈 |
| ③ 洪脈 | ④ 緊脈 |
| ⑤ 芍脈 | |

34. 咽喉의 한쪽이나 兩側이 모두 붉게 부으면서 疼痛이 있거나 漬爛이 있는 것은?

- | | |
|------|------|
| ① 乳蛾 | ② 瘰瘤 |
| ③ 白喉 | ④ 丹毒 |
| ⑤ 隱疹 | |

35. 望舌의 내용 중 잘못 연결된 것을 고르시오.

- | |
|-------------------|
| ① 齒痕舌: 虛證 |
| ② 肥大舌: 心脾熱盛, 濕熱內盛 |
| ③ 强硬舌: 熱入心包, 肝風內動 |
| ④ 白苔: 表證, 寒證, 濕證 |
| ⑤ 芒刺舌: 氣血兩虛 |

36. 다음 중 大腸에 관한 설명으로 적절치 않은 것은?

- | |
|--|
| ① 肺와 그 經脈이 서로 絡屬되어 있으며 장부지간 表裏를 이룬다. |
| ② 變化出之字 謂小腸中物至此 精汁盡化 變爲糟粕而出 |
| ③ 小腸이 아래로 보낸 飲食物의 찌꺼기를 接受하여水分을 再吸收하므로 ‘大腸主津’이라 한다. |
| ④ 肺、胃의 氣가 上逆하는 경우 便溏에 이를 수 있으며, 반대로 傳道作用 失調시 肺、胃의 氣가 下陷하는 병변에 이를 수 있다. |
| ⑤ 大腸小腸受胃之榮氣乃能行津液于上焦 灌溉皮毛 充實腠理. 若飲食不節 胃氣不及 大腸小腸無所稟受 故津液涸竭焉. |

37. 아래 주어진 증상에 대한 변증으로 가장 알맞은 것은?

- 筋惕肉瞞, 肢麻震顫, 眩暈欲仆, 甚則 卒然仆倒 或 閉厥
- | | |
|--------|--------|
| ① 热極生風 | ② 肝陽化風 |
| ③ 陰虛風動 | ④ 血虛生風 |
| ⑤ 血燥生風 | |

38. 아래 팔호 안에 가장 알맞은 한자를 고르시오.

- 諸瘡喘嘔 皆屬於()

- | | |
|-----|-----|
| ① 火 | ② 热 |
| ③ 上 | ④ 下 |
| ⑤ 肺 | |

39. 다음 중 小便을 排泄하기 전 清濁을 分별하는 과정과 가장 관계 깊은 부위는?

- | | |
|------|------|
| ① 關門 | ② 魂門 |
| ③ 飛門 | ④ 噴門 |
| ⑤ 幽門 | |

40. ‘所生病者 狂 瘡 溫淫 汗出 劍衄 口渴 脣脢 頸腫 喉痺 大腹水腫 膝臍腫痛’에 해당하는 經脈은?

- | | |
|----------|---------|
| ① 足陽明胃經 | ② 足太陰脾經 |
| ③ 足太陽膀胱經 | ④ 足少陰腎經 |
| ⑤ 足厥陰肝經 | |