

한의학문제풀이(22회)

01. ①
 02. ③
 03. ④
 04. ① 麻黃은 節을 제거
 05. ⑤
 06. ①
 07. ⑤
 08. ⑤
 09. ④
 10. ⑤
 11. ⑤ 通竅活血湯: 頭面四肢周身 血營血瘀之證
(頭髮脫落, 眼疼白珠紅, 糟鼻子, 耳聾年久, 紫癍風)
血府逐瘀湯: 胸中血府血瘀之證
(頭痛胸痛, 胸不任物, 胸任重物, 天亮出汗)
膈下逐瘀湯: 肚腹血瘀之證
(積塊, 小兒痞塊, 痛不移處, 臥則腹墜)
少腹逐瘀湯: 少腹積塊疼痛或無疼痛, 小腹脹滿
身痛逐瘀湯: 痹證
通經逐瘀湯: 紫色 或 暗黑色痘瘡
會厭逐瘀湯: 痘瘡 進行時 飲水即噎
 12. ②
 13. ②
 14. ③
 15. ②
 16. ①
 17. ③
 18. ⑤
 19. ⑤
 20. ②
 21. ②
 22. ④
 23. ②
 24. ①
- ※ 藥의 氣味厚薄: 味薄者升而生 氣厚者浮而長
氣味平者化而成 氣薄者降而收 味厚者沈而藏

25. ①
 26. ①
 27. ②
 28. ②
 29. ②
 30. ②
 31. ⑤
 32. ②
 33. ④
 34. ①
 35. ④
 36. ⑤
 37. ①
 38. ⑤
 39. ⑤
 40. ③
- 緊脈: 脈來緊張有力 主病 - 寒症, 痛症이 심할 때
革脈: 脈來大而弦急, 浮取即得, 按之即空,
如按鼓皮, 外強中虛 主病 - 出血, 失精
伏脈: 隱伏, 極重按之於透筋着骨, 指下始嘗其形
主病 - 病邪內伏深沈之症
牢脈: 脈來大弦實, 沈按始得
主病 - 陰寒이 쌓인 病證 (疝氣, 癥瘕, 痞塊)
短脈: 來脈이 短, 澁(처음과 끝이 無에 가깝다.)
主病 - 氣鬱, 氣虛, 失精, 亡血