

한의학문제풀이(31회)

01. ⑤
02. ②
03. ①
04. ④
05. ①
06. ③
07. ②
08. ②
09. ⑤
10. ⑤
11. ②
12. ④
13. ④ ※ 潦心湯 비교
半夏潦心湯 - 心下滿而不痛
生薑潦心湯 - 心下痞 乾噫食臭
甘草潦心湯 - 心下痞 下利 乾嘔 心煩
附子潦心湯 - 心下痞 惡寒汗出
(胃中蘊熱 兼表陽虛)
大黃黃連潦心湯 - 心下痞
(氣痞-實邪가 없어 만지면 潞) 脈關上浮
14. ①
15. ④
16. ①
17. ③
18. ②
19. ⑤
20. ③
21. ①
22. ⑤
23. ③
24. ②

25. ⑤

	巨 刺	繆 刺
發病部位	病邪가 經脈에 있다.	病邪가 絡脈에 있다.
診斷의 근거	病痛이 左側에 있으면 右側의 脈象에도 病理變化가 있다.	身體에 痘痛이 있어도 三部의 脈象에는 病理變化가 없다.
刺鍼部位	刺經. 左側에 有病하면 右側의 經穴을 取하고 右側에 有病하면 左側의 經穴을 取한다.	刺絡. 有關한 經脈의 四肢端의 井穴과 皮膚의 鬱血된 絡脈을 潉한다. (右病左治 左病右治는 同)

26. ④
27. ① 子午搗臼法 (선보후사)
28. ①
29. ② 已饑已渴→大泄之後
30. ①
31. ④
32. ②
33. ③
34. ④
35. ④
36. ② / ① 일치한다 ③ 回刺, 分刺, 關刺 ④
足中趾 ⑤ 양급과 음급이 바뀜
37. ①
38. ④
39. ③
40. ① ※ 痞滿燥實
痞 - 积實, 滿 - 厚朴, 燥 - 芒硝, 實 - 大黃
大承氣湯 - 痞滿燥實證, 小承氣湯 - 痞滿便秘,
調胃承氣湯 - 潮熱便秘 燥實證