

## 한의학문제풀이(36회)

01. ③

02. ③

03. ④

04. ③

05. ①

06. ③

07. ③

08. ④

09. ②

10. ②

11. ②

12. ③ 단기 기억: 意, 장기 기억: 志

13. ②

14. ②

15. ③

16. ④ 溫: 緩和, 强壯, 升提, 補陽, 開胃, 通經絡, 止湯, 散寒, 祛痰, 安神, 理氣益氣, 行血止汗 등  
熱: 發熱, 興奮, 發汗, 刺戟, 回陽 등  
涼: 補陰, 止血, 降火, 清肅, 清熱 등  
寒: 解熱, 消炎, 鎮靜, 降火, 止血, 瀉下 등

17. ②

18. ③

19. ②

20. ③

21. ①

22. ②

23. ①

24. ④

25. ③

26. ③

27. ③ 散劑: 표면적이 비교적 크기 때문에 內服한 후에 胃腸 점막에 기계적인 보호 작용을 하면서 吸收하여 효과가 나타나는 것이 (환제에 비해) 비교적 빠르다. 또한 藥材를 절약하고 服用과 휴대가 편리하다.

丸劑: 湯劑에 비해 복용 후 分解, 吸收가 완만하며 藥效가 오래가고 藥材가 절약되고 服用, 휴대, 저장 등이 편리하다. 일반적으로 慢性 虛弱性 疾病에 적용한다. 일부는 구급약으로 사용될 때도 있으며, 가열하여 煎煮하는 것이 마땅하지 않은 경우, 峻烈한 약재가 약효를 서서히 발휘하도록 하기 위한 경우, 기타 湯劑로 달여서 복용하는 것이 적당하지 않은 경우 등에도 활용한다.

28. ②

29. ③

30. ② 精의 외후: 髮, 耳, 腰, 骨

31. ④ 心爲聲音之主 肺爲聲音之門 腎爲聲音之根

32. ③ 소아의 특성: 陽有餘 陰不足 (肺 脾 腎 ↓) / 臟腑嬌嫩, 形氣未充 / 生氣旺盛, 發育迅速

33. ③

34. ①

35. ④

36. ④ 白朮 → 黃柏

37. ② 留者攻之, 逸者行之

38. ③ 五七 陽明脈衰 面始焦 髮始墮

39. ①

40. ③ 決=通, 瀆=水道